آکادمی آنلاین تیزلاین

قوی‌ترین پلتفرم آموزشی تیزهوشان

- برگزار کننده کلاس های آنلاین و حضوری تیزهوشان و المپیاد از پایه چهارم تا دوازدهم
- آزمون های آنلاین و حضوری
- مشاوره تخصصی

با اسکن QR کد روبرو وارد صفحه اینستاگرام آکادمی تیزلاین شو و از محتواهای آموزشی رایگان لذت ببر

TIZLINE.IR

برای ورود به صفحه اصلی سایت آکادمی تیزلاین کلیک کنید

برای دانلود دفترچه آزمون های مختلف برای هر پایه کلیک کنید

برای مطالعه مقالات بروز آکادمی تیزلاین کلیک کنید

www.Tizline.ir ۰۲۱ ۴۴۱۳ ۶۹۷۵ ۰۹۳۳ ۳۸۴ ۰۲۰۲ ۵۰۰۰۲۶۹۱۳۲۴

ردیف	استفاده از ماشین حساب با ۴ عمل اصلی مجاز است.	بارم
۱	جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. (برخی ار کلمات اضافه هستند) **۶۵۰ – آهن – ۲۰۰ – بنفش – سبز – ۱۷ – قرمز – آبی – یک – چهار – رقیق – ۲۷ – غلیظ – ۴۵۰ – هلیوم – نئون** الف. در طیف نشری خطی اتم هیدروژن طول موج ۴۱۰ نانومتر به رنگ ..... ظاهر می‌شود. ب. رنگ شعله نمک‌های لیتیم و نمک‌های مس به ترتیب ..... و ..... است. پ. در واکنش تهیه آمونیاک، شرایط بهینه واکنش نیتروژن با هیدروژن دمای ..... درجه سانتی‌گراد و فشار ..... اتمسفر با حضور کاتالیزگر ..... انجام می‌شود. ت. گلاب دو اتیشه یک محلول ..... و سرم فیزیولوژی یک محلول ..... است. ج. درصد جرمی نمک در دریای مرده ..... درصد است. چ.حدود ۷ درصد از مخلوط گاز طبیعی را ..... تشکیل می‌دهد.	۲/۵
۲	اگر تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌های عنصر ^{75}A برابر ۹ باشد، عدد اتمی این عنصر را بدست آورده و شماره گروه و دوره‌ی آن را مشخص کنید.	۱/۲۵
۳	عنصر مس از دو ایزوتوپ $^{65}_{29}Cu$, $^{63}_{29}Cu$ تشکیل شده است. اگر جرم اتمی میانگین مس ۶۳/۸ باشد، درصد فراوتنی ایزوتوپ سبک تر ار حساب کنید.	۱
۴	آرایش الکترونی $_{24}Cr^{3+}$ را بصورت گسترده نوشته و به سوالات زیر پاسخ دهید، الف. اعداد کوانتومی اصلی (n) و فرعی (L) آخرین زیرلایه این یون را مشخص کنید. ب. در این یون چند زیرلایه با L=0 وجود دارد؟ پ. آرایش الکترونی Cr را بصورت فشرده بنویسید.	۱/۵

۵	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف. چهار گاز اصلی تشکیل دهنده هوای پاک و خشک در لایه تروپوسفر را برحسب افزایش درصد حجمی آنها بنویسید. ب. گازهای موجود در هواکره را درصنعت به چه روشی جداسازی می‌کنند؟ پ. با توجه به جدول، کدام گاز در هوای مایع به شکل مایع وجود ندارد؟ ت. بین دو گاز اکسیژن و نیتروژن، کدام زودتر از هوای مایع جدا می‌شود؟ چرا؟	۱/۵

گاز	نقطهٔ جوش (°C)
نیتروژن	-۱۹۶
اکسیژن	-۱۸۳
آرگون	-۱۸۶
هلیم	-۲۶۹

۶	آرایش الکترون نقطه‌ای (ساختار لوئیس) ترکیب‌های زیر را رسم کنید. $_6C$, $_7N$, $_8O$ NO^+ CO_3^{2-}	۱

۷	جدول زیر را کامل کنید.				۱
	نام	آمونیوم سولفات		گوگرد ترا اکسید	
	فرمول شیمیایی		PCl_3		Fe_2O_3

۸	درستی یا نادرستی هریک از عبارت‌های زیر را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن شکل درست آنها را بنویسید. الف. تغییر رنگ سفید شکر به هنگام گرما دادن نشان از انجام یک واکنش فیزیکی است. ب. شمار اتم‌های آلومنیوم فسفات از منیزیم نیترات بیشتر است. پ. اتانول ازجمله سوخت‌های سبز است. ت. استون و هگزان حلال آلی هستند. ث. تکنسیم معروف‌ترین فلز پرتوزا است.	۲
۹	پس از موازنه واکنش زیر به سوالات پاسخ دهید: $N=14$, $O=16$ $H=1$ g/mol $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$ الف.در اثر سوختن کامل ۱۰/۲ گرم آمونیاک، چند لیتر گاز نیتروژن مونواکسید در شرایط استاندارد واکنش تولید خواهد شد؟ ب. برای تولید ۲/۵ مول آب به چند گرم گاز اکسیژن نیاز خواهد بود؟	۲

۱۰	درباره اوزون به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف. چرا اوزون مولکولی با دو چهره است؟ ب. آرایش الکترون نقطه‌ای (ساختار لوئیس) آن را رسم کنید.$_{8}O$	۱
۱۱	برای تهیه محلول ۸۰ درصد جرمی نیتریک اسید، چند گرم HNO_3 را باید رد ۱۶۰ گرم آب حل کرد؟	۱
۱۲	باتوجه به نمودار انحلال پذیری نمک‌ها به سوالات پاسخ دهید: الف. انحلال پذیری کدام نمک با دما رابطه معکوس دارد؟ ب. انحلال‌پذیری پتاسیم کلرید در دمای ۷۴ درجه سانتی‌گراد تقریبا چند گرم است؟ پ. هریک از نقاط A,B,C برای پتاسیم کلرید به ترتیب چه نوع محلولی است؟(سیر شده- سیر نشده – فراسیرشده) ت. اگر دمای ۲۵۰ گرم محلول سیر شده‌ی پتاسیم نیترات را از ۴۰ به ۲۰ درجه سانتی‌گراد کاهش دهیم چند گرم رسوب در ته ظرف بوجود خواهد آمد؟  	۲/۲۵
۱۳	در هر مورد با گذاشتن علامت < = > مقایسه‌های انجام شده‌ی زیر را بررسی کنید. نقطه جوش : H_2O □ H_2S قطبی بودن : استون □ هگزان گشتاور دوقطبی: N_2 □ CO انحلال در آب: CO_2 □ O_2 نقطه ذوب: اتانول □ H_2	۱/۲۵

۴	فشار ظرفی پر از گاز هیدروژن، در ۵۰ درجه سانتی‌گراد برابر ۲ اتمسفر است، با توجه به شرایط زیر، فشار چه تغییری می‌کند؟ الف. هیدروژن بیشتری اضافه شود. ب. حجم ظرف افزایش یابد. پ. دما افزایش یابد.	۰/۷۵

نمره آزمون: «اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد- آرزومند »

تیزلاین
آکادمی آنلاین آموزش

ردیف		بارم
	استفاده از ماشین حساب با ۴ عمل اصلی مجاز است.	
۱	جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. (برخی از کلمات اضافه هستند) ۶۵۰ – آهن –۲۰۰– بنفش – سبز – ۱۷ – قرمز – آبی – یک – چهار – رقیق – ۲۷ – غلیظ – ۴۵۰ – هلیوم - نئون الف. در طیف نشری خطی اتم هیدروژن طول موج ۴۱۰ نانومتر به رنگ بنفش ظاهر می‌شود. ب. رنگ شعله نمک‌های لیتیم و نمک‌های مس به ترتیب قرمز و سبز است. پ. در واکنش تهیه آمونیاک، شرایط بهینه واکنش نیتروژن با هیدروژن دمای ۴۵۰ درجه سانتی‌گراد و فشار ۲۰۰ اتمسفر با حضور کاتالیزگر آهن انجام می‌شود. ت. گلاب دو اتیشه یک محلول غلیظ و سرم فیزیولوژی یک محلول رقیق است. ج. درصد جرمی نمک در دریای مرده ۲۷ درصد است. چ.حدود ۷ درصد از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می‌دهد.	۲/۵
۲	اگر تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌های عنصر ^{75}A برابر ۹ باشد، عدد اتمی این عنصر را بدست آورده و شماره گروه و دوره‌ی آن را مشخص کنید. $p+n=75$ ، $n-e=9$ ، $e=p$ ، $p+n=75 \Rightarrow p=75-42 \Rightarrow p=33$ $n-p=9$ ، $2n=84$ ، $n=42$ $_{33}A: [_{18}Ar]3d^{10}4s^2 4p^3$ گروه ۱۵ دوره ۴	۱/۲۵
۳	عنصر مس از دو ایزوتوپ $^{65}_{29}Cu$, $^{63}_{29}Cu$ تشکیل شده است. اگر جرم اتمی میانگین مس ۶۳/۸ باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر ار حساب کنید. $\bar{m}=\frac{m_1 f_1+m_2 f_2}{f_1+f_2} \Rightarrow 63.8=\frac{63 f_1+65 f_2}{100} \Rightarrow 6380=63 f_1+65 f_2$ $f_1+f_2=100$ ، $f_1=100-f_2$ $6380=63(100-f_2)+65 f_2 \Rightarrow 6380=6300-63 f_2+65 f_2$ $80=2 f_2 \Rightarrow f_2=40$ ، $f_1=60$	۱
۴	آرایش الکترونی $_{24}Cr^{3+}$ را بصورت گسترده نوشته و به سوالات زیر پاسخ دهید، $_{24}Cr^{3+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$ ، $_{24}Cr: [_{18}Ar]3d^5 4s^1$ الف. اعداد کوانتومی اصلی (n) و فرعی (L) آخرین زیرلایه این یون را مشخص کنید. $n=3$ ، $L=2$ ب. در این یون چند زیرلایه با L=0 وجود دارد؟ ۶e پ. آرایش الکترونی Cr را بصورت فشرده بنویسید.	۱/۵

۵ (۱/۵)

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف. چهار گاز اصلی تشکیل دهنده هوای پاک و خشک در لایه تروپوسفر را برحسب افزایش درصد حجمی آنها بنویسید.

$N_2 - O_2 - Ar - CO_2$

ب. گازهای موجود در هواکره را درصنعت به چه روشی جداسازی می‌کنند؟

تقطیر جزبه جز هوای مایع

پ. با توجه به جدول، کدام گاز در هوای مایع به شکل مایع وجود ندارد؟

هلیم

گاز	نقطهٔ جوش (°C)
نیتروژن	-۱۹۶
اکسیژن	-۱۸۳
آرگون	-۱۸۶
هلیم	-۲۶۹

ت. بین دو گاز اکسیژن و نیتروژن، کدام زودتر از هوای مایع جدا می‌شود؟ چرا؟

نیتروژن - چون نقطه جوش پایین‌تری دارد.

۶ (۱)

آرایش الکترون نقطه‌ای (ساختار لوئیس) ترکیب‌های زیر را رسم کنید.

$C \Rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^2 \Rightarrow 4$

$O \Rightarrow 1s^2 2s^2\ 2p^4 \Rightarrow 6$

$N \Rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^3 \Rightarrow 5$

CO_3^{2-}



NO^+

۷ (۱)

جدول زیر را کامل کنید.

نام	آمونیوم سولفات	فسفر تری کلرید	گوگرد تترا اکسید	آهن III اکسید
فرمول شیمیایی	$Al_2(SO_4)_3$	PCl_3	SO_3	Fe_2O_3

۸ (۲)

درستی یا نادرستی هریک از عبارت‌های زیر را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن شکل درست آنها را بنویسید.

الف. تغییر رنگ سفید شکر به هنگام گرما دادن نشان از انجام یک واکنش فیزیکی است. نادرست - تغییر شیمیایی

ب. شمار اتم‌های آلومنیوم فسفات از منیزیم نیترات بیشتر است. نادرست $AlPO_4 - Mg(NO_3)_2$

پ. اتانول ازجمله سوخت‌های سبز است. درست

ت. استون و هگزان حلال آلی هستند. درست

ث. تکنسیم معروف‌ترین فلز پرتوزا است. نادرست - اورانیم

۹ (۲)

پس از موازنه واکنش زیر به سوالات پاسخ دهید:

$N=14\ ,\ O=16\ \ H=1\ g/mol$

$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$

الف.در اثر سوختن کامل ۱۰/۲ گرم آمونیاک، چند لیتر گاز نیتروژن مونواکسید در شرایط استاندارد واکنش تولید خواهد شد؟

$10{,}2\,g\,NH_3 \times \frac{1\,mol\,NH_3}{17\,g\,NH_3} \times \frac{4\,mol\,NO}{4\,mol\,NH_3} \times \frac{22{,}4\,L\,NO}{1\,mol\,NO} = 13{,}44\,L\,NO$

ب. برای تولید ۲/۵ مول آب به چند گرم گاز اکسیژن نیاز خواهد بود؟

$2{,}5\,mol\,H_2O \times \frac{5\,mol\,O_2}{6\,mol\,H_2O} \times \frac{32\,g\,O_2}{1\,mol\,O_2} = 66{,}67\,g\,O_2$

۱۰ ۱

درباره اوزون به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف. چرا اوزون مولکولی با دو چهره است؟ چون در لایه استراتوسفر نقش حفاظتی در برابر پرتوهای فرابنفش داشته در لایه تروپوسفر آلاینده است

ب. آرایش الکترون نقطه‌ای (ساختار لوئیس) آن را رسم کنید.

$_8O: 1s^2 2s^2 2p^4 \Rightarrow 6$



۱۱ ۱

برای تهیه محلول ۸۰ درصد جرمی نیتریک اسید، چند گرم HNO_3 را باید رد ۱۶۰ گرم آب حل کرد؟

$w/w = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow 80 = \frac{x}{160+x} \times 100 \Rightarrow 12800 + 80x = 100x$

$12800 = 20x$

$x = 640$ گرم

۱۲ ۲/۲۵

باتوجه به نمودار انحلال پذیری نمک‌ها به سوالات پاسخ دهید:

الف. انحلال پذیری کدام نمک با دما رابطه معکوس دارد؟ Li_2SO_4 لیتیم سولفات

ب. انحلال‌پذیری پتاسیم کلرید در دمای ۷۴ درجه سانتی‌گراد تقریبا چند گرم است؟ ۵۰ گرم

پ. هریک از نقاط A,B,C برای پتاسیم کلرید به ترتیب چه نوع محلولی است؟(سیر شده- سیر نشده – فراسیرشده)

B: سیر نشده — C: فراسیرشده — A: سیر شده

ت. اگر دمای ۲۵۰ گرم محلول سیر شده‌ی پتاسیم نیترات را از ۴۰ به ۲۰ درجه سانتی‌گراد کاهش دهیم چند گرم رسوب در ته ظرف بوجود خواهد آمد؟



$\text{رسوب} = \frac{S_2 - S_1}{100 + S_1} \times \text{جرم محلول}$

$\text{رسوب} = \frac{40 - 30}{100 + 40} \times 250$

$\text{رسوب} = \frac{30 \times 250}{140} = 46.875$ گرم

۱۳ ۱/۲۵

در هر مورد با گذاشتن علامت < = > مقایسه‌های انجام شده‌ی زیر را بررسی کنید.

نقطه جوش : $H_2O > H_2S$ — قطبی بودن : استون > هگزان

گشتاور دوقطبی: $N_2 < CO$ — انحلال در آب: $CO_2 > O_2$

نقطه ذوب: اتانول > H_2

۴	فشار ظرفی پر از گاز هیدروژن، در ۵۰ درجه سانتی‌گراد برابر ۲ اتمسفر است، با توجه به شرایط زیر، فشار چه تغییری می‌کند؟ الف. هیدروژن بیشتری اضافه شود. فشار افزایش می‌یابد ب. حجم ظرف افزایش یابد. فشار کاهش می‌یابد پ. دما افزایش یابد. فشار افزایش می‌یابد	۰/۷۵

نمره آزمون: «اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد- آرزومند »

تیزلاین
آکادمی آنلاین آموزش