



آکادمی آنلاین تیز لاین

قوی ترین پلتفرم آموزشی تیز هوشان

برگزار کننده کلاس های آنلاین و حضوری تیز هوشان

و المپیاد از پایه چهارم تا دوازدهم

آزمون های آنلاین و حضوری

مشاوره تخصصی

با اسکن QR کد روبرو
وارد صفحه اینستاگرام
آکادمی تیز لاین شو و از
محتوه های آموزشی
رایگان لذت ببر



TIZLINE.IR

برای ورود به صفحه اصلی سایت آکادمی تیز لاین کلیک کنید

برای دانلود دفترچه آزمون های مختلف برای هر پایه کلیک کنید

برای مطالعه مقالات بروز آکادمی تیز لاین کلیک کنید

آکادمی آموزشی تیزلاین

بازدید از سایت بزرگ‌ترین کشوری تیزهوشان و کنکور

۱. در آزادراه زنجان-تبریز از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ صبح ۲۳۷۰ خودرو از عوارضی عبور کرده‌اند که همه آن‌ها تک‌سرنشین یا دو‌سرنشین بوده‌اند. این خودروها در مجموع ۱۸۳۲۰ لیتر بنزین در مسیر مصرف کرده‌اند. می‌دانیم هر خودروی تک‌سرنشین، ۷ لیتر و هر خودروی دو‌سرنشین، ۸ لیتر بنزین در این مسیر مصرف کرده است. تعداد کل خودروهای تک‌سرنشین چند تاست؟

۱۱۸۵ (۵) ۱۰۵۰ (۴) ۶۴۰ (۳) ۴۸۰ (۲) ۳۲۰ (۱)

راه حل:

گزینه (۳) صحیح است.

- فرض کنید تعداد خودروهای تک‌سرنشین و دو‌سرنشین را به ترتیب با x و y نشان دهیم در این صورت خواهیم داشت:

$$\begin{cases} x + y = 2370 \\ 7x + 8y = 18320 \end{cases} \Rightarrow 7x + 8(2370 - x) = 18320 \Rightarrow 18960 - x = 13320 \Rightarrow x = 640$$

۲. در مثلث متساوی‌الساقین ABC که در آن $AB = AC$ نقاط X و Y روی پاره خط AC طوری قرار گرفته‌اند که X بین A و Y قرار دارد و به علاوه $\angle BY = \angle AX = \angle BX$ ، زاویه $\angle BAC$ چند درجه است؟

$\frac{185}{4}$ (۵) ۴۱ (۴) ۴۰ (۳) ۳۸ (۲) $\frac{۹۵}{۲}$ (۱)

راه حل:

گزینه (۳) صحیح است.

- همانند شکل زیر فرض کنید $\angle BAX = \alpha$. می‌دانیم $\angle BAX = \angle BAX = \alpha$ می‌شود از طرفی $\angle BXC = 2\alpha$ زاویه خارجی مثلث ABX است پس $\angle BYA = 2\alpha$ است.

طبق فرض مسئله می‌دانیم $\angle BYA = 2\alpha$ است.

در مثلث ABC می‌دانیم:


$$\angle BAX = \alpha, AB = AC \Rightarrow \angle ACB = \angle ABC = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$$

- در مثلث BYC زاویه خارجی است پس خواهیم داشت:

$$\angle YBC + \angle YCB = \angle BYA \Rightarrow 10^\circ = \angle YBC = 2\alpha - \left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) \Rightarrow \alpha = 40^\circ$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

مجری همایش کلاس و آزمون در سراسر کشور



شکل ۱

با حضور اساتید بزرگ‌دیده کشوری تیزهوشان و کنکور

۳. x و y دو عدد حقیقی هستند که $18 = 2^{x+1} \cdot 3^{-y} = 2^{x-y}$. مقدار xy چقدر است؟

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) -۲ (۵) $\frac{1}{2}$

راه حل:

گزینه (۱) صحیح است.

چون $18 = 2^{x+1} \cdot 3^{-y}$ ، نتیجه می‌گیریم که $2^x = 9$ ، پس

$$2^x = 9 \Rightarrow 2^{xy} = 9^y = (2^y)^x = \frac{1}{4} = 2^{-2} \Rightarrow xy = -2$$

می‌توان با لگاریتم گرفتن از دو رابطه‌ی بالا راه حل مشابهی برای مسئله ارائه کرد.

۴. چند عدد طبیعی کوچک‌تر از ۱۳۹۳ مثل a وجود دارد که $\underbrace{a^a \cdots a}_{\text{بار}}^a$ مربع کامل باشد؟

- (۱) ۳۷ (۲) ۶۹۶ (۳) ۷۱۵ (۴) ۷۳۳ (۵) ۷۳۴

راه حل:

گزینه (۳) صحیح است.

دو حالت در نظر می‌گیریم.


حالت (۱): a عددی زوج است. در این حالت، عدد مذکور حتماً مربع کامل است زیرا برابر است با a^2 به توان عددی زوج.

تعداد اعداد زوج کوچک‌تر از ۱۳۹۳ برابر است با ۶۹۶.

آکادمی آموزشی تیزلاین

حالت (۲) : عددی فرد است. در این حالت، عدد مذکور برابر است با a به توان عددی فرد، پس تنها در صورتی مربع کامل است که خود a مربع کامل باشد. تعداد اعداد فرد مربع کامل کوچک‌تر از ۱۳۹۳ برابر است با ۱۹ بنابراین تعداد a های با خاصیت مورد نظر، برابر است با $19 + 19 = 38$.

۵. نمودار تابع $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را در پایین می‌بینید. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: تابعی صعودی است که برای هر عدد حقیقی x . $g(x) \leq f(x)$. حداقل مقدار (۲) $g(x)$ کدام است؟



- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)
- ۵ (۵)

راه حل:

گزینه‌ی (۳) صحیح است.

با توجه به صعودی بودن تابع g ، برای هر $x \geq 2$ باید $g(x) \geq g(2)$ و بنابراین $g(x) \geq g(2) \geq f(x)$. اما دقت کنید که کمترین مقدار f برای x های بیشتر یا مساوی مربوط به $x = 5$ است که مقدار $f(x)$ برابر ۲ می‌باشد. این موضوع نتیجه می‌دهد که حداقل مقدار $g(x)$ برابر ۲ است. ضمناً بهوضوح تابع صعودی زیر هم همهی شرط‌های مسئله را برآورده می‌کند:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ 2 & 2 \leq x \leq 5 \\ f(x) & 5 \leq x \end{cases}$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

مبجزی همایش کلاس و آزمون در سراسر کشور



۶. در شهر نیستان قیمت نی‌ها با افزایش طول نی زیاد می‌شود. تاجری در شکرستان قصد وارد کردن نی از نیستان را دارد. در شکرستان لیوان‌ها به شکل مخروط ناقص با ارتفاع ۱۶ سانتی‌متر، قطر دهانه^{۱۰} سانتی‌متر و قطر انتهای ۶ سانتی‌متر هستند. تاجر قصد دارد کمترین پول را خرج کند ولی با توجه به قوانین شکرستان به هیچ وجه نی نباید کاملاً داخل لیوان قرار گیرد. اندازه^۰ نی‌هایی که او می‌خرد چقدر است؟ (از قطر نی صرف نظر می‌کنیم، یعنی نی را یک پاره‌خط فرض می‌کنیم)

$$10\sqrt{3} \quad (5)$$

$$2\sqrt{87} \quad (4)$$


$$8\sqrt{5} \quad (3)$$

$$2\sqrt{89} \quad (2)$$

$$2\sqrt{73} \quad (1)$$

راه حل:

گزینه^۰ (۳) صحیح است.



در شکل بالا مقطعی از لیوان رسم شده است. در این شکل AB دهانه و CD انتهای لیوان است. نی‌هایی که تاجر می‌خرد از طرفی باید کمترین طول را داشته باشند، و از طرف دیگر نباید به طور کامل در لیوان قرار بگیرند. در نتیجه این نی‌ها باید مانند پاره‌خط BD روی لبه لیوان قرار بگیرند.

$$AN + MB = AB - MN = AB - CD = 10 - 6 = 4$$

پس طبق تقارن شکل حول محور عمودی داریم $AN = MB = 2$. برای محاسبه BD از قضیه فیثاغورس استفاده

آکادمی آموزشی تیزلاین

می‌کنیم.

$$BD^2 = BN^2 + ND^2 = (2+6)^2 + 16^2 = 8\sqrt{5}$$

۷. مجموعه $\{1, 2, \dots, 10\}$ چند زیرمجموعه ناتهی دارد که اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عضو آن ۶ باشد؟

۱۰۲۴ (۵)

۲۵۶ (۴)

۱۲۸ (۳)

۶۴ (۲)

۳۲ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۳) صحیح است.

برای انتخاب یک زیرمجموعه از $\{1, 2, \dots, 10\}$ که اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عضو آن ۶ است، ابتدا کوچک‌ترین عضو را انتخاب می‌کنیم. این کار ۴ حالت دارد چرا که کوچک‌ترین عضو می‌تواند یکی از اعداد ۱، ۲، ۳، یا ۴ باشد. فرض کنید کوچک‌ترین عضو را m بنامیم. پس بزرگ‌ترین عضو برابر $m+6$ خواهد بود. برای انتخاب دیگر اعضای زیرمجموعه، ۳۲ حالت داریم چرا که دیگر اعضا، زیرمجموعه‌ای دلخواه از $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ هستند. پس در کل $128 = 32 \times 4$ حالت برای انتخاب این گونه مجموعه‌ها داریم.

۸. کشور شکرستان از سه استان نمکستان، فلفلستان و سماقستان تشکیل شده‌است که به ترتیب $10, n$ و $2n$ شهر دارند. می‌دانیم تعداد شهروندان در شهرهای مختلف این کشور یکسان است و جمعیت کل کشور $1 + n + n^2$ نفر است. عدد n در کدام یک از محدوده‌های زیر قرار دارد؟

۵۰ تا ۴۱ (۵)

۴۰ تا ۳۱ (۴)

۳۰ تا ۲۱ (۳)

۲۰ تا ۱۱ (۲)

۱۰ تا ۱ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۳) صحیح است.

فرض کنید جمعیت هر شهر k نفر باشد. پس باید

$$n^2 + n + 1 = (3n + 10)k$$

بنابراین

$$\begin{aligned} 3n + 10 | n^2 + n + 1 &\Rightarrow 3n + 10 | 3n^2 + 3n + 3 \\ 3n + 10 | 3n^2 + 10n & \quad \left. \right\} \Rightarrow 3n + 10 | 7n - 3 \\ 3n + 10 | 21n - 9 & \quad \left. \right\} \Rightarrow 3n + 10 | 21n + 70 \\ 3n + 10 | 21n + 70 & \quad \left. \right\} \Rightarrow 3n + 10 | 79 \end{aligned}$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

با حضور اساتید بزرگهای کشوری تیزهوشان و کنکور

و چون ۷۹ عددی اول است و $1 > 3n + 10 = 79$ پس باید $n = 23$ و در نتیجه $.n = 23$

۹. $ABCD$ ذوزنقه‌ای است که در آن $CD = 3AB$ و $AB \parallel CD$ و نقاط M و N به ترتیب وسط اضلاع BC و AD هستند و مساحت ذوزنقه ۳۲ است. مساحت مثلث AMN چه قدر است؟

۱۶ (۵)

۱۵ (۴)

۱۲ (۳)

۱۰ (۲)

۸ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۲) صحیح است.

اگر مساحت مثلث ABC را برابر S_1 و مساحت مثلث ACD را برابر S_2 قرار دهیم و طبق فرض مسئله می‌دانیم $S_1 + S_2 = 32$ است.

مساحت مثلث ABM نصف مساحت مثلث ABC است زیرا دارای ارتفاع یکسان هستند ولی قائده‌ی مثلث ABM نصف قائده‌ی ABC است پس مساحتیش برابر $\frac{S_1}{2}$ است به طور مشابه مساحت مثلث AND نصف ACD است پس برابر $\frac{S_2}{2}$ است.


جمع مساحت‌های مثلث‌های ABD و BCD برابر کل ذوزنقه و برابر ۳۲ است ولی مساحت مثلث BCD سه برابر مساحت مثلث ABD است زیرا دارای ارتفاع یکسان هستند ولی قائده‌ی مثلث BCD که ضلع CD باشد سه برابر قائده‌ی مثلث ABD یعنی AB است. پس مساحت مثلث BCD برابر ۲۴ است. در مثلث BCD داریم:

$$\frac{CM}{CB} = \frac{CN}{CD} = \frac{1}{2}$$

پس با استفاده از قضیه تالس مثلث CMN با نسبت تشابه $\frac{1}{2}$ با مثلث CBD متشابه است پس مساحت مثلث CMD ربع مساحت مثلث CBD است که برابر ۶ می‌شود.

جمع مساحت مثلث‌های ABM ، ABD و CMN برابر با $\frac{S_1 + S_2}{2} + 6 = 22$ است پس مساحت باقی مانده از مساحت کل همان مساحت مثلث AMN است که برابر $22 - 10 = 12$ می‌شود.

آکادمی آموزشی تیزلاین



شکل ۲

۱۰. برای چند مقدار صحیح n دو چندجمله‌ای $1 - nx + x^3 + nx^3 - n^x$ و $x^3 + nx - n^x$ ریشهٔ حقیقی مشترک دارند؟

(۵) بی‌نهایت

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ (۱)

راه حل:

گزینهٔ (۲) صحیح است.

اگر $x = 0$ ریشهٔ حقیقی مشترک دو چندجمله‌ای $1 - nx + x^3 + nx^3 - n^x$ و $x^3 + nx - n^x$ باشد، باید ریشهٔ تفاضل آن‌ها نیز باشد،
یعنی

$$(x_0 - n^x) - (nx_0 - 1) = x_0(1 - n) + (1 - n)(1 + n) = (1 - n)(x_0 + n + 1) = 0.$$

پس $x_0 = 1$ یا $x_0 = -n$ یا $x_0 = -1$. اگر $x_0 = 1$ باشد، این دو چندجمله‌ای یکسان هستند و همهٔ ریشه‌های آن‌ها یکی است. ضمناً چون چندجمله‌ای درجه سوم حتماً ریشهٔ حقیقی دارد، این دو ریشهٔ حقیقی مشترک خواهند داشت.

اما اگر $x_0 = -n$

$$(-n - 1)^x + (-n - 1) - n^x = 0 \Rightarrow n^x + 4n^x + 4n + 2 = 0.$$

چون $n > 0$ صحیح است، با توجه به رابطهٔ بالا باید زوج باشد، یعنی عدد صحیح m باشد که $n = 2m$. با جای‌گزین کردن این رابطه در بالا به دست می‌آید که:

$$8m^x + 16m^x + 8m + 2 = 0 \Rightarrow 4m^x + 8m^x + 4m + 1 = 0.$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

که متساوی آخر به دلیل زوج بودن سمت راست و فرد بودن سمت چپ امکان ندارد. پس در این حالت دو معادله ریشه‌ی مشترکی ندارند.

۱۱. حداقل چند مثلث غیر همنهشت وجود دارد که طول اضلاع آن‌ها از بین اعداد $۱, ۲, ۴, ۸, \dots, ۲^{۱۰}$ باشند؟ (طول اضلاع می‌توانند با هم برابر باشند.)

۱۶۵ (۵)

۱۲۰ (۴)

۹۰ (۳)

۶۶ (۲)

۵۵ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۲) صحیح است.

توجه کنید که اعداد داده شده توان‌های دو هستند و نیز شرط لازم و کافی برای اینکه بتوان با سه طول داده شده مثلث ساخت این است که در نامساوی مثلث صدق کنند یعنی جمع دو طول کمتر بیش از بیشترین طول باشد. اکنون فرض کنید سه طول مورد نظر 2^x و 2^y و 2^z باشند که $z \geq y \geq x$ در این صورت اگر $y > x$ خواهیم داشت:

$$2^z + 2^y \leq 2^y + 2^y = 2^{y+1} \leq 2^x$$

بنابراین سه طول داده شده تشکیل مثلث نمی‌دهند پس باید $x = y$ باشد یعنی مثلث‌ها فقط می‌توانند متساوی الساقین باشند و به علاوه z می‌تواند هر کدام از اعداد x تا x باشد که هر کدام مثلثی جدید می‌شود. یعنی $1 + x$ مثلث با طول بزرگترین ضلع 2^x داریم و $10 \leq x \leq 10$. پس در کل

$$1 + 2 + 3 + \dots + 10 = 66$$

مثلث غیر همنهشت وجود دارد.

۱۲. برای عدد طبیعی n چندجمله‌ای $P_n(x)$ را برابر $(x+n)^{2^{1393}-1}$ تعریف می‌کنیم. می‌دانیم

$$P_{1393}(P_{1392}(\dots(P_1(x))\dots))$$

یک چندجمله‌ای از درجه $2^{1393}-1$ است. ضریب $x^{2^{1393}-1}$ در این چندجمله‌ای برابر کدام است؟

۲۱۳۹۳ (۵)

۲۱۳۹۳ - ۱ (۴)

۲۱۳۹۲ + ۱ (۳)

۲۱۳۹۲ (۲)

۰ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۵) صحیح است.

آکادمی آموزشی تیزلاین

با حضور اساتید بزرگدهی کشوری تیزهوشان و کنکور

به استقرا روی n نشان می‌دهیم که $Q_n(x) = P_n(P_{n-1}(\dots(P_1(x))\dots))$ یک چندجمله‌ای از درجه‌ی 2^n است که ضریب جملات x^{2^n} و x^{2^n-1} در آن به ترتیب ۱ و 2^n هستند.

در مورد 1 که همه‌ی نکات فوق درست هستند. حالت فرض کنید که احکام بالا تا

n درست باشد یعنی:

$$Q_n(x) = x^{2^n} + 2^n x^{2^n-1} + \dots$$

حال

$$Q_{n+1}(x) = P_{n+1}(Q_n(x)) = (x^{2^n} + 2^n x^{2^n-1} + \dots + n)^2 = x^{2^{n+1}} + 2(x^{2^n})(2^n x^{2^n-1}) + \dots$$

دقت کنید که مابقی جملات نمی‌توانند منجر به جمله‌های با درجه‌ی 2^n و یا $1 - 2^n$ شوند.

پس عدد خواسته شده در صورت مسئله برابر 2^{1393} خواهد بود.

۱۳. فرض کنید $\{A, B\}$ و $A = \{1, 2, \dots, 100\}$ و $B = \{1, 2, \dots, 10\}$. تعداد توابع $f : A \rightarrow B$ را بباید که برای هر دو عدد طبیعی m و n که $mn \leq 10$ و $2 \leq m, n \leq 10$ رابطه $f(mn) = mf(n)$ برقرار باشد.

2×10^5 (۵)

10^5 (۴)

10^4 (۳)

10^3 (۲)

10^2 (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۴) صحیح است.

همه‌ی زوج‌های مرتب (m, n) که در شرایط $mn \leq 10$ و $2 \leq m, n \leq 10$ صدق می‌کنند عبارتند از

$$(2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (5, 2)$$

که بنابر خاصیت تابع f ، این روابط را به دست می‌آوریم

$$f(6) = 2f(3), f(8) = 2f(4), f(10) = 2f(5), f(6) = 3f(2),$$

$$f(9) = 3f(3), f(8) = 4f(2), f(10) = 5f(2)$$

با توجه به روابط بالا، اگر مقدار $f(2)$ را مشخص کنیم، مقادیر $f(n)$ به ازای $n = 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10$ مشخص می‌شود. در واقع اگر قرار دهیم $a = f(2)$ ، به دست می‌آوریم.

$$f(3) = 3a/2, f(4) = 2a, f(5) = 5a/2, f(6) = 3a, f(8) = 4a, f(9) = 9a/2, f(10) = 5a$$


آکادمی آموزشی تیزلاین

و در نتیجه a عددی طبیعی و زوج است و از آن جا که همهٔ اعداد بالا باید عضو مجموعهٔ $\{1, 2, \dots, 100\}$ باشند، باید $a \leq 20$.

برعکس، اگر f هر عدد طبیعی زوج و کوچکتر یا مساوی ۲۰ باشد و مقادیر $f(n)$ را برای $n = ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۹, ۱۰$ طبق روابط بالا تعیین کنیم و سپس مقدار $f(۱)$ و $f(۷)$ را نیز به دلخواه از مجموعهٔ $\{1, 2, \dots, 100\}$ انتخاب کنیم، تابع حاصل در شرایط مسئله صدق می‌کند. پس برای $f(۲)$ ، $f(۱۰)$ انتخاب وجود دارد و برای $f(۱)$ و $f(۷)$ نیز هر کدام 100 انتخاب وجود دارد. بنابراین تعداد توابع مطلوب برابر است با

$$10 \times 100 \times 100 = 10^5$$

۱۴. پادشاه شکرستان که قصری به شکل مربع دارد، به تازگی کتبه‌ای به خط نمکی مربوط به یکی از اجدادش پیدا کرده که ریاضی‌دان بوده است. پس از ترجمهٔ کتبه توسط زبان‌شناسان مشخص شد که در نقطه‌های مختلفی از شهر، گنج‌هایی وجود دارد. ترجمهٔ کتبه را در زیر می‌بینید.




گنج‌ها در نقطه‌هایی از شهر پنهان گشته‌اند که اگر هر کدام از آن‌ها را به ترتیب نسبت به ضلع شمالی، ضلع جنوبی، ضلع شرقی، ضلع غربی، قطر اول و در نهایت قطر دوم قصر قرینه کنیم به جای اول بازگردد.

چند گنج در شهر پنهان شده است؟

(۱) ۰ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۸

راه حل:

گزینهٔ (۲) صحیح است.



فرض کنید راس‌های مربع در نقاط $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ و $(1,1)$ واقع باشند. در شکل رو به رو با شروع از نقطه دلخواه (x,y) مختصات نقاط به دست آمده بعد از هر تقارن را مشخص کرده‌ایم. برای این‌که نقطه آخر بر نقطه اول منطبق شود باید داشته باشیم $x = 2 - y$ و $y = 2 - x$. پس دقیقاً یک نقطه با این خاصیت وجود دارد.

۱۵. مهندس شش دیواری قصد دارد نقشه‌ی خانه‌ای با شش دیوار را طراحی کند. او می‌خواهد سه تا از دیوارها در امتداد شمالی-جنوبی و با طول‌های ۲، ۴ و ۶ متر باشند و سه تا از دیوارها نیز در امتداد شرقی-غربی و با طول‌های ۴، ۶ و ۱۰ متر باشند. او چند نقشه‌ی مختلف با این ویژگی‌ها می‌تواند بکشد؟

۲۴ (۵)

۲۰ (۴)

۱۶ (۳)

۱۲ (۲)

۸ (۱)


راه حل:

گزینه‌ی (۳) صحیح است.

در نقشه‌ی ساختمان، ابتدا دیوار با طول ۱۰ را ثابت در نظر می‌گیریم. از آنجایی که دیوارها یکدیگر را قطع نمی‌کنند، دو دیوار افقی با طول‌های ۴ و ۶، هر دو یا در بالا و یا در پایین دیوار با طول ۱۰ هستند. فرض کنید دیوارهای افقی با طول‌های ۴ و ۶ هر دو در بالای دیوار با طول ۱۰ باشند. پس به خاطر تقارن موجود، در نهایت تعداد حالات را در ۲ ضرب خواهیم کرد. به همین ترتیب دیوارهای عمودی به طول‌های ۲ و ۴، هر دو یا در چپ و یا در راست دیوار عمودی به طول ۶ قرار دارند. باز هم فرض می‌کنیم این دو دیوار سمت راست دیوار عمودی به طول ۶ قرار داشته باشند و جواب این حالت را نیز در ۲ ضرب خواهیم کرد.

آکادمی آموزشی تیزلاین

با این مفروضات برای چیدن دو دیوار افقی به طولهای ۴ و ۶، و دو دیوار عمودی به طولهای ۲ و ۴، با توجه به این که دیوار افقی با طول ۴ بالاتر باشد یا دیوار افقی با طول ۶ این که دیوار عمودی با طول ۲ راستر باشد یا دیوار عمودی با طول ۴، چهار حالت مختلف معتبر خواهیم داشت که در شکل زیر مشخص آند.



پس در کل $16 = 2 \times 2 \times 4$ حالت خواهیم داشت.

۱۶. می‌دانیم عددی طبیعی در مبنای دو، 3^0 رقمی است. در مورد تعداد ارقام این عدد در مبنای سه چه می‌توان گفت؟

(۱) حتماً ۱۸ رقمی است.

(۲) حتماً ۱۹ رقمی است.

(۳) حتماً ۲۰ رقمی است.

(۴) برای بعضی اعداد ۱۸ رقمی و برای بعضی ۱۹ رقمی است.

(۵) برای بعضی اعداد ۱۹ رقمی و برای بعضی ۲۰ رقمی است. راه حل:

گزینه‌ی (۲) صحیح است.

از آنجایی که این عدد در مبنای دو، 3^0 رقمی است، پس حداقل 2^{29} و حداکثر $1 - 2^{30}$ است.

داریم

$$2^{29} = 2^{24} \times 2^5 = (2^8)^3 \times 2^5 = (256)^3 \times 32 > (243)^3 \times 27 = 3^{15} \times 3^3 = 3^{18}$$

پس 2^{29} حداقل در مبنای ۳ حداقل ۱۹ رقمی است.

آکادمی آموزشی تیزلاین

از طرف دیگر

$$\begin{aligned}
 2^{3^0} &= 2^{11} \times 2^{11} \times 2^8 = 2048 \times 2048 \times 256 \\
 &= (2048 \times \sqrt{1/1}) \times (2048 \times \sqrt{1/1}) \times \frac{256}{1/1} \\
 &< (2048 \times 1,05) \times (2048 \times 1,05) \times \frac{256}{1/1} \\
 &< 2160 \times 2160 \times 240 < 2187 \times 2187 \times 243 \\
 &= 3^7 \times 3^7 \times 3^5 = 3^{19}
 \end{aligned} \tag{1}$$

پس $1 - 2^{3^0}$ از $1 - 3^{19}$ کمتر بوده و در نتیجه این عدد حداقل 19 رقمی است.

پس هر عدد که در مبنای دو، 3^0 رقمی است، در بازه $[1 - 2^{29}, 2^{3^0}]$ قرار داشته و با توجه به آنچه گفته شد، 19 رقم دارد.

۱۷. عدد صحیح n را «نه چندان بزرگ» می‌گوییم هرگاه برای هر دو عدد مثبت x و y که $2 = (x+1)(y+1)$ داشته باشیم $xy + \frac{1}{xy} \geq n$. بزرگ‌ترین عدد نه چندان بزرگ کدام است؟

۷ (۵)

۶ (۴)

۵ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

راه حل:

گزینه (4) صحیح است.

برای هر دو عدد حقیقی x و y می‌دانیم که $(x-y)^2 \geq 0$ و این یعنی $4xy \leq (x+y)^2$. حال اگر x و y در رابطه $(x+1)(y+1) = 2$ صدق کنند داریم:

$$xy + x + y = 1 \Rightarrow (1 - xy)^2 \geq 4xy \Rightarrow (xy)^2 + 1 \geq 6xy \Rightarrow xy + \frac{1}{xy} \geq 6$$

از طرف دیگر برای این که در این نابرابر تساوی اتفاق بیفتد باید $x = y$ باشد که شرط $(x+1)(y+1) = 2$ نتیجه می‌دهد که $1 = x = y = \sqrt{2}$ در این حالت:

$$xy + \frac{1}{xy} = (\sqrt{2} - 1)^2 + \frac{1}{(\sqrt{2} - 1)^2} = 3 - 2\sqrt{2} + 3 + \sqrt{2} = 6$$

۱۸. رئوس یک پنجضلعی محدب را به ترتیب ساعت‌گرد A, B, C, D, E می‌نامیم. می‌دانیم $\angle BAE = \angle DAC = \angle EDA = \angle DCA = \angle BCA = \angle CDA = 93^\circ$ و $\frac{AE}{AB} = \frac{AC}{AD} = \frac{AD}{AE}$. اگر $AC = 2\sqrt{3}$ و آن‌گاه مقدار BCA برابر کدام گزینه است؟

آکادمی آموزشی تیزلاین

۳ (۵)

$3 \sin 93^\circ$ (۴)

$\frac{1}{\sqrt{3}}$ (۳)

$\frac{1}{3}$ (۲)

$\frac{1}{r} \sin 93^\circ$ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۵) صحیح است.

مطابق فرض مسئله می‌دانیم

$$\angle EAB = 2 \angle DAC \Rightarrow \angle EAD + \angle CAB = \angle DAC$$

نقطه‌ی X را مطابق شکل روی ضلع DC طوری انتخاب می‌کنیم که

$$\angle XAC = \angle EAD$$

$$\angle DAX = \angle CAB$$

دو مثلث EAD و XAC متشابه هستند زیرا

$$\angle ACX = \angle ADE, \angle EAD = \angle XAC$$

پس خواهیم داشت:

$$\frac{EA}{AX} = \frac{AD}{AC} \quad (۱)$$

همچنین دو مثلث BAC و XAD متشابه هستند زیرا

$$\angle ADX = \angle ACB, \angle DAX = \angle CAB$$


پس خواهیم داشت:

$$\frac{AX}{AB} = \frac{AD}{AC} \quad (۲)$$

در نهایت اگر رابطه‌ی اول را در رابطه‌ی دوم ضرب کنیم خواهیم داشت:

$$\frac{EA}{AB} = \left(\frac{AD}{AC} \right)^2 = 3$$

با حضور اساتید بزرگ‌دیده کشوری تیزهوشان و کنکور



شکل ۲

۱۹. x و y دو عدد حقیقی هستند که $\sin(y) + \cos(x) = 1$. بیشترین مقدار $\sin(x) + \cos(y)$ کدام است؟

۲ (۵)

$1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴)

$\sqrt{2}$ (۳)

$\sqrt{2}$ (۲)

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۱)

راه حل:


گزینه‌ی (۳) صحیح است.

$$\begin{aligned}
 1 + (\sin(y) + \cos(x))^2 &= (\sin(x) + \cos(y))^2 + (\sin(y) + \cos(x))^2 \\
 &= \sin^2(x) + \cos^2(x) + \sin^2(y) + \cos^2(y) \\
 &\quad + 2(\sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)) \\
 &= 2 + 2\sin(x+y) \\
 &\leq 4
 \end{aligned}$$

پس $|\sin(y) + \cos(x)| \leq \sqrt{3}$ است. از سوی دیگر برای تساوی اگر $x = \frac{\pi}{2}$ و $y = \frac{\pi}{2}$ باشد، داریم

$$\sin(x) + \cos(y) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = 1, \quad \sin(y) + \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$$

آکادمی آموزشی تیزلاین



۲۰. دو صفحه پلاستیکی شفاف و رنگی به شکل دو دایره برابر داریم که هر کدام از آنها توسط سه شعاع با زاویه‌های 120° ، به سه قسمت برابر تقسیم شده‌اند. قسمت‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. هرگاه دو رنگ روی هم قرار گیرند، رنگی جدید ایجاد می‌شود و رنگ‌های ترکیبی ایجاد شده نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. مثلاً در شکل رو به رو به 10° رنگ مختلف به وجود آمده است.

حداکثر تعداد رنگ‌های مختلفی که در یک وضعیت قرار گرفتن صفحه‌ها می‌تواند به وجود بیاید چند تاست؟

۱۵ (۵)

۱۴ (۴)

۱۳ (۳)


۱۲ (۲)

۱۱ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۴) صحیح است.

در ابتدا ۶ رنگ داریم و برای ایجاد هر رنگ جدید باید یک رنگ از یک صفحه بر روی رنگی از صفحه‌ی دیگر قرار گیرد و چون هر صفحه‌ای سه رنگ دارد این کار به 3×3 طریق ممکن است. بنابراین حداکثر ۹ رنگ جدید ایجاد می‌شود. پس نمی‌توان بیش از ۱۵ رنگ به وجود آورد. به علاوه در شکل زیر مثالی که در آن ۱۴ رنگ به وجود آمده را مشاهده می‌کنید:




شکل ۱

در ادامه ثابت می‌کنیم چرا به وجود آوردن ۱۵ رنگ نیز غیر ممکن است. توجه کنید که اگر مرکز دو صفحه روی هم

آکادمی آموزشی تیزلاین

با حضور استاد بزرگدیده کشوری تیزهوشان و کنکور


قرار گیرد رنگ های ابتدایی از بین می‌روند و اگر دو دایره هم‌دیگر را قطع نکنند ۶ رنگ خواهیم داشت. بنابراین در ادامه فرض می‌کنیم دو دایره در دو نقطه متقاطع اند پس روی هرکدام از دو دایره دو کمان تشکیل می‌شود که یکی درون دایره‌ی دیگر است و یکی بیرون آن و می‌دانیم طول کمان بیرونی بیشتر از کمان درونی است.



شکل ۲

در واقع همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید مراکز دو صفحه و دونقطه‌ی تقاطع تشکیل یک لوزی می‌دهند و اندازه‌ی کمان درونی که برابر با زاویه‌ی a در شکل فوق است کمتر از نیم‌صفحه خواهد بود.


حال توجه کنید که هر دایره به سه کمان 120° درجه تقسیم شده که هر کمان به یک رنگ است بنابراین چون کمان‌های بیرونی بیش از نیم‌صفحه اند نمی‌توانند یک رنگ باشند پس دو یا سه رنگ دارند. که در شکل زیر مشاهده می‌کنید:



شکل ۳

آکادمی آموزشی تیزلاین


وقتی کمان بیرونی یکی از دایره‌ها دو رنگ داشته باشد به این معنی است که یکی از قسمت‌های آن به طور کامل درون دایره‌ی دیگر قرار دارد - مانند قسمتی که در شکل ۵ به رنگ آبی است - درنتیجه رنگ اولیه‌ی آن به وجود نمی‌آید پس در این حالت نمی‌تواند ۱۵ رنگ به وجود آید.



شکل ۴

بنابراین تنها بررسی حالتی می‌ماند که کمان بیرونی هر دو دایره سه رنگ داشته باشند. در این حالت چون کمان‌های بیرونی سه رنگ دارند و طول هر کمان رنگی 120° درجه است یک قسمت رنگی از هر دو دایره خواهد بود که مرز بیرونی آن به طور کامل در کمان بیرونی آن دایره قرار گیرد. اکنون ناحیه‌های شکل را به ترتیب زیر نام‌گذاری می‌کیم:

با حضور اساتید بزرگ‌تری کشوری تیزهوشان و کنکور



شکل ۵

حال بنا بر گفته‌های بالا یک قسمت رنگی به تمامی در ناحیه‌ی A و یک قسمت رنگی دیگر به تمامی در ناحیه‌ی B قراردارند و در نتیجه رنگ حاصل از روی هم قرار گرفتن آن دو به وجود نمی‌آید. بنابراین ثابت می‌شود حداقل ۱۴ رنگ قابل تولید است.

۲۱. یک زیرمجموعهٔ ناتهی از اعداد طبیعی را «منظمه» گوییم اگر میانگین اعضای آن عددی طبیعی باشد و آن را «فوق منظم» گوییم اگر همهٔ زیرمجموعه‌های ناتهی آن منظم باشند. تعداد زیرمجموعه‌های فوق منظم پنج عضوی از مجموعهٔ $\{1, 2, \dots, 67\}$ چند است؟

۴۷ (۵)

۱۹ (۴)

۱۴ (۳)

۱۲ (۲)

(۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۴) صحیح است.

مجموعه‌ی مورد نظر را $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ در نظر می‌گیریم. منظم بودن زیرمجموعه‌های A معادل با شرایط زیر است:

$$(آ) \text{ برای هر } i, j \text{ متمایز, } 2|a_i + a_j$$

$$(ب) \text{ برای هر } i, j, k \text{ متمایز, } 3|a_i + a_j + a_k$$

$$(ج) \text{ برای هر } i, j, k, l \text{ متمایز, } 4|a_i + a_j + a_k + a_l$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

$$5|a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \quad (5)$$

شرط (آ) معادل است با این که همه‌ی a_i ها دارای زوجیت یکسان باشند. شرط (ب) معادل است با این که همه‌ی a_i به پیمانه‌ی ۳ همنهشت باشند، زیرا اگر i, j, k, k' متمایز باشند، بنابر شرط (ب)،

$$\left. \begin{array}{l} 3|a_i + a_j + a_k \\ 3|a_i + a_j + a_{k'} \end{array} \right\} \Rightarrow a_k \equiv a_{k'}$$

مشابهًا شرط (ج) معادل است با این که همه‌ی a_i به پیمانه‌ی ۴ همنهشت باشند. بنابراین شرط (ج)، شرط (آ) را نتیجه می‌دهد. از طرف دیگر، شرط‌های (ب) و (ج) در کنار هم، معادل با این هستند که همه‌ی a_i به پیمانه‌ی ۱۲ همنهشت باشند.

پس مجموعه‌ی پنج عضوی A فوق منظم است، اگر و تنها اگر همه‌ی اعضای آن به پیمانه‌ی ۱۲ همنهشت باشند و جمع اعضای آن بر ۵ بخش‌پذیر باشد.

اکنون توجه کنید که هر عدد طبیعی a را می‌توان به صورت $12b + t$ نمایش داد که b عددی صحیح و نامنفی است و $0 \leq t \leq 11$. پس a ها را به شکل $a_i = 12b_i + t_i$ نمایش می‌دهیم. از آن‌جا که a_i ها باید به پیمانه‌ی ۱۲ همنهشت باشند، پس t_i ها با هم برابرند. پس می‌توان نوشت $a_i = 12b_i + t$.

اکنون داریم

$$a_1 + \dots + a_5 = 12(b_1 + \dots + b_5) + 5t$$

بنابراین شرط این که مجموع a_i ها بر ۵ بخش‌پذیر باشد، معادل با این است که مجموع b_i ها بر ۵ بخش‌پذیر باشد. اما از آن‌جا که $0 \leq t \leq 11$ پس $a_i = b_i + t$ همچنین چون a_i ها متمایزند، پس t ها نیز باید متمایز باشند. به راحتی می‌توان دید که تنها دو زیرمجموعه‌ی پنج عضوی از $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ وجود دارد که مجموع اعضای آن‌ها بر پنج بخش‌پذیر است. که عبارت‌اند از:

$$\{0, 1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

در حالت اول، a_i ها عبارتند از $\{t, 12+t, 24+t, 36+t, 48+t\}$ که t هر یک از اعداد $1, 2, \dots, 11$ می‌تواند باشد. پس در این حالت ۱۲ زیرمجموعه‌ی فوق منظم پیدا کردیم.

در حالت دوم، ها عبارتند از $\{12+t, 24+t, 36+t, 48+t, 60+t\}$ ، که در این حالت برای این که $0 \leq t \leq 11$ لازم است که $7 \leq t \leq 11$. پس در این حالت برای t هفت حالت $1, 2, \dots, 7$ وجود دارد.

بنابراین در مجموع ۱۹ حالت وجود دارد.

آکادمی آموزشی تیزلاین

۲۲. شش نقطه در صفحه داریم که هیچ سه تابی از آن‌ها هم خط نیستند. در بین زوایایی که این نقاط تشکیل می‌دهند، حداقل چند زاویه در بازه $(90^\circ, 180^\circ)$ وجود دارد؟

۲۴) ۵

۲۰) ۴


۱۸) ۳

۱۲) ۲

۶) ۱

راه حل:

گزینه ۴) صحیح است.



با این نقاط $\triangle ABC$ مثلث می‌توان ساخت و در هر مثلث حداقل یک زاویه منفرجه خواهیم داشت. پس در کل حداقل $= ۲۰$ زاویه در بازه $(90^\circ, 180^\circ)$ خواهیم داشت. شکل بالا مثالی از این تعداد زاویه است.

۲۳. نقطه P روی کمان BC از دایره محیطی مثلث ABC (کمانی که شامل A نیست) قرار دارد. می‌دانیم $AB = 2$ و $BC = 4$ و $AC = 3$. نقاط M و N روی خط BC قرار دارند به طوری که B بین C و M است و C بین N و B است. می‌دانیم $MA \perp PN$ بر دایره محیطی مثلث ABC مماس هستند و $AP \cdot MA = PN$. خط BC را در نقطه T قطع می‌کند. اندازه PT چقدر است؟

$\frac{4\sqrt{5}}{5}$) ۵

$\frac{2\sqrt{15}}{3}$) ۴

$\frac{5\sqrt{13}}{7}$) ۳

$\frac{3\sqrt{3}}{2}$) ۲

۱) $\frac{5}{2}$

راه حل:

گزینه ۵) صحیح است.

خطوط NP و MA بر دایره مماس هستند پس قوت نقطه N نسبت به دایره برابر با

$$NP^2 = NC \cdot NB$$

است و قوت نقطه M نسبت به دایره برابر با

$$MA^2 = MB \cdot MC$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

با حضور اساتید بزرگده کشوری تیزهوشان و کنکور

طبق فرض مسئله می‌دانیم $NP^r = MA^r$ پس خواهیم داشت:

$$MA^r = MB \cdot MC = MB^r + 4MB = (MB + 2)^r - 4$$

$$NP^r = NC \cdot NB = NC^r + 4NC = (NC + 2)^r - 4$$

$$\Rightarrow (MB + 2)^r = (NC + 2)^r \Rightarrow (MB - NC) \cdot (MB + NC + 4) = 0 \Rightarrow MB = NC$$

طبق قضیه‌ی سینوسها در مثلث ABT خواهیم داشت:

$$\frac{MA}{\sin(ATM)} = \frac{MT}{\sin(MAT)}$$

طبق قضیه‌ی سینوسها در مثلث NPT خواهیم داشت:

$$\frac{PN}{\sin(PTN)} = \frac{NT}{\sin(TPN)}$$

زاویه‌ی ظلی NPA برابر نصف کمان ACP و زاویه‌ی ظلی MAP برابر نصف کمان ABP است پس دو زاویه‌ی MAT و TPN مکمل یکدیگر و $\sin(TPN) = \sin(MAT)$ است. پس خواهیم داشت:

$$\frac{MA \cdot \sin(MAT)}{\sin(ATM)} = \frac{PN \cdot \sin(TPN)}{\sin(PTN)}$$

$$\Rightarrow MT = NT \Rightarrow BT = CT$$

برای بدست آوردن طول AT ابتدا طول AT یعنی میانه مثلث را محاسبه می‌کنیم.

طول میانه‌ی مثلث با استفاده از رابطه‌ی زیر که در انتهای اثبات خواهیم کرد محاسبه می‌شود.


$$AT^r = \frac{b^r}{2} + \frac{c^r}{2} - \frac{a^r}{4}$$

$$\Rightarrow AT = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

قوت نقطه‌ی T نسبت به دایره برابر است با:

$$BT \cdot TC = AT \cdot TP$$

$$\Rightarrow TP = \frac{BT \cdot TC}{AT} = \frac{4\sqrt{10}}{5}$$



شکل ۴

بدست آوردن طول میانه یک مثلث : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید AM میانه‌ی وارد بر ضلع BC و N وسط AC قرار دارد.

با استفاده از قضیه‌ی کسینوسها در مثلث MNC خواهیم داشت:

$$-\sqrt{MN \cdot NC \cdot \cos(MNC)} = MC^2 - MN^2 - NC^2 \quad (1)$$

و با استفاده از قضیه‌ی کسینوسها در مثلث ANM خواهیم داشت:

$$-\sqrt{MN \cdot AN \cdot \cos(180^\circ - MNC)} = AM^2 - MN^2 - AN^2$$

$$\Rightarrow -\sqrt{MN \cdot NC \cdot \cos(MNC)} = -AM^2 + MN^2 + AN^2 \quad (2)$$

با استفاده از رابطه‌ی ۱ و ۲ داریم:


$$MC^2 - MN^2 - NC^2 = -AM^2 + MN^2 + AN^2$$

$$\Rightarrow AM^2 = 2AN^2 + 2MN^2 - MC^2$$

از طرفی طبق قضیه‌ی تالس MN برابر نصف AB و موازی آن است. پس

$$AM^2 = 2\left(\frac{AC}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{AB}{2}\right)^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2$$

آکادمی آموزشی تیزلاین



شکل ۴-۱

۲۴. عدد طبیعی M را خوب می‌نامیم هرگاه اعداد طبیعی نه لزوماً متمایز a_1, a_2, \dots, a_n ($n \geq 3$) یافت شوند به طوری که $M = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$ و خواص زیر برقرار باشد.

(آ) M بر توان سوم هیچ عدد طبیعی بزرگ‌تر از یکی بخش‌پذیر نیست.

(ب) اگر $i \leq n$ آن‌گاه $a_{i-1}a_{i+1}$ بر a_i بخش‌پذیر است. ($a_{n+1} = a_1$ و $a_0 = a_n$)

چند عدد خوب کوچک‌تر از ۱۵ داریم؟

۷۲ (۵)

۴۴ (۴)

۲۹ (۳)

۲۶ (۲)

۱) (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۳) صحیح است.

ادعا می‌کنیم عدد طبیعی M خوب است اگر و تنها اگر این عدد مربع کامل باشد.

اثبات: ابتدا فرض کنید عدد طبیعی M خوب باشد. در اینصورت اعداد a_1, a_2, \dots, a_n ($n \geq 3$) وجود دارند که برای هر $i \leq n$ آن‌گاه $a_{i-1}a_{i+1}$ بر a_i بخش‌پذیر باشد. حال فرض کنید در M عامل اول p وجود داشته باشد. پس چون $M = a_1a_2\dots a_n$ وجود دارد که بر p بخش‌پذیر باشد. از طرفی چون $a_{j-1}a_{j+1}$ بر a_j بخش‌پذیر است، پس حداقل یکی از اعداد a_{j-1} یا a_{j+1} بر p بخش‌پذیر هستند. پس بر p بخش‌پذیر است. با توجه به فرض سوال، M نمی‌تواند بر p^2 بخش‌پذیر باشد. پس برای هر عامل اول p در M دقیقاً بر p^2 بخش‌پذیر است. پس توان همه‌ی عوامل اول M ، دقیقاً برابر ۲ است.


از طرف دیگر فرض کنید توان هر عامل اول M برابر ۲ باشد. پس عدد طبیعی r وجود دارد که $M = r^2$. حال دنباله معرفی شده در زیر خواص مورد نظر صورت سوال را داشته و در نتیجه M عدد خوبی خواهد بود.

$$n = 3, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = r, \quad a_3 = r$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

به حل مسئله باز می‌گردیم. با توجه به ادعا، باید تعداد اعداد کوچکتر از ۲۰۱۵ را بیابیم که مربع کامل هستند و توان هر عامل اول آن‌ها دقیقاً ۲ است. با توجه به این که $1936 = 44 \times 44 = 2025 - 45 \times 45$ پس ا عدد خوب مورد نظر دقیقاً k^2 هایی هستند که $44 \leq k \leq 45$ و از هیچ عامل اولی بیش از یکی ندارد، که با یک بررسی ساده مشخص می‌شود این اعداد عبارت‌اند از $1^2, 2^2, 3^2, 5^2, 6^2, 7^2, 10^2, 11^2, 13^2, 14^2, 15^2, 17^2, 19^2, 21^2, 22^2, 23^2, 26^2, 29^2, 30^2, 31^2, 33^2, 34^2, 35^2, 37^2, 38^2, 39^2, 41^2, 42^2, 43^2$ که تعداد آن‌ها ۲۹ تاست.

۲۵. متحرکی در فضای ۳D به گونه‌ای حرکت می‌کند که در لحظه t در نقطه $(x(t), y(t), z(t))$ قرار دارد. اگر نمودارهای $x(t)$, $y(t)$ و $z(t)$ بر حسب t به شکل‌های زیر باشند، مسافتی که این متحرک از $t=0$ تا $t=8$ طی می‌کند برابر کدام گزینه است؟



$$16\sqrt{\frac{v}{c}} (5)$$

$$8\sqrt{\frac{v}{c}} (4)$$

$$8\sqrt{\frac{v}{c}} (3)$$

$$4\sqrt{\frac{v}{c}} (2)$$

$$\frac{8\sqrt{v}}{c} (1)$$

راه حل:

گزینه‌ی (۴) صحیح است.

اگر به مسیر حرکت این متحرک کمی فکر کنیم، خواهیم فهمید که در هر کدام از بازه‌های $[0, 1]$, $[1, 2]$, ... و $[7, 8]$ که سه مؤلفه‌ی حرکت آن به صورت خط در آمده است، خود متحرک هم در فضای روی پاره‌خط‌هایی حرکت می‌کرده است. پس کافی است که طول هر کدام از این پاره‌خط‌ها را یافته و با هم جمع کنیم.

آکادمی آموزشی تیزلاین

از طرف دیگر با توجه به شباهت حرکت متحرک در هر کدام از بازه‌ها طول این ۸ پاره خط با هم برابر است، پس کافی است طول یکی از آن‌ها مثلاً پاره خط مربوط به بازه‌ی اول را یافته و در ۸ ضرب کنیم.
متحرک در لحظه‌ی $t = 0$ در نقطه‌ی $(1, 0, 0)$ و در لحظه‌ی $t = 1$ در نقطه‌ی $(1, \frac{\sqrt{3}}{3}, 0)$ قرار دارد. بنابراین طول طی شده در بازه‌ی $[0, 1]$ برابر است با:

$$\sqrt{(1 - 0)^2 + (0 - 1)^2 + (0 - \frac{\sqrt{3}}{3})^2} = \sqrt{\frac{7}{3}}$$

پس کل مسافت طی شده از $t = 0$ تا $t = 1$ برابر $\sqrt{\frac{7}{3}} \cdot 8$ خواهد بود.

۲۶. «پشیزها» موجوداتی میکروسکوپی هستند که اندازه‌های مختلفی دارند. هرگاه دو پشیز با اندازه‌های x و y در مجاورت هم قرار بگیرند، می‌توانند با صرف انرژی‌ای برابر $|x - y|$ به هم بچسبند و یک پشیز با اندازه‌ی $x + y$ ایجاد کنند.
اگر 1025 پشیز با اندازه‌ی 1 روی یک خط ردیف شده باشند، کمترین انرژی‌ای که باید در مجموع صرف کنند تا تبدیل به یک پشیز با اندازه‌ی 1025 شوند، چهقدر است؟

۳۲ (۵)

۳۱ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

راه حل:

گزینه‌ی (۲) صحیح است.

ابتدا نشان می‌دهیم با صرف انرژی 10 می‌توان پشیز با اندازه 1025 به دست آورد. برای این کار در 10 گام پشیزها را به هم می‌چسبانیم به طوری که در هر گام تنها یک واحد انرژی مصرف گردد.
در گام 1 ، دو پشیز نخست را به هم می‌چسبانیم تا یک پشیز به طول 2 و 1023 پشیز به طول 1 داشته باشیم. (بدون صرف انرژی)

در گام 2 ، 1024 پشیز باقیمانده را دوبدو به یکدیگر می‌چسبانیم. با این کار یک پشیز به طول 3 و 511 پشیز به طول 2 خواهیم داشت. (یک واحد صرف انرژی)

در گام 3 ، 512 پشیز باقیمانده را دوبدو به یکدیگر می‌چسبانیم. با این کار یک پشیز به طول 5 و 255 پشیز به طول 4 خواهیم داشت. (یک واحد صرف انرژی)

به همین صورت در گام j ($j \leq 9$)، j^{th} پشیز باقیمانده را دوبدو به یکدیگر می‌چسبانیم. با این کار یک پشیز به طول $1 + 2^j$ و $1 - 2^{j-1}$ پشیز به طول 2^j خواهیم داشت. (یک واحد صرف انرژی)

آکادمی آموزشی تیزلاین

جاذبه اسلامی و ایرانی کشوری تیزهوشان و کنکور

در گام ۱۰ (آخر)، ۲ پشیز باقیمانده (یکی به طول ۵۱۳ و دیگری به طول ۵۱۲) را به یکدیگر می‌چسبانیم. با این کار یک پشیز به طول ۱۰۲۵ خواهیم داشت. (یک واحد صرف انرژی)

حال نشان می‌دهیم این راه بھینه است؛ یعنی برای دستیابی به پشیز با طول ۱۰۲۵، صرف حداقل ۱۰ واحد انرژی لازم است.

ادعا: برای هر عدد طبیعی n که $n < 2^{i+1} - 2^i$ ، صرف i واحد انرژی برای به دست آوردن یک پشیز به طول n لازم است.

اثبات: حکم را به استقرای قوی روی n اثبات می‌کنیم.

پایه: حکم برای $n = 3, 5, 6$ به سادگی قابل بررسی و صحیح است.

گام: فرض کنید $n < 2^{i+1} - 2^i$ ، در اینصورت برا به دست آوردن پشیز به طول n ، باید دو پشیز به یکدیگر چسبیده باشند. پس فرض کنید این دو پشیز طول‌های x, y داشته باشند. پس $x + y = n$ بدون کاسته شدن از کلیت مسئله فرض می‌کنیم $y \geq x$. در اینصورت دو حالت داریم:

حالت ۱، $y = x$: در این حالت با توجه به این که $n < 2^{i+1} - 2^i$ ، پس $x = y < 2^{i-1}$ ، پس در این حالت با توجه به فرض استقرار، صرف $(1 - i)$ واحد انرژی لازم است. با توجه به این که $3 \geq i$ ، این مقدار از i کمتر نخواهد بود.

حالت ۲، $y > x$ و $y \neq 2^i$: در حالت خواهیم داشت:

$$2^i < n = x + y < 2x < 2n < 2^{i+2}$$

پس $x < 2^{i-1}$ پس با توجه به فرض استقرار، برای تولید پشیز به طول x نیاز به حداقل $1 - i$ واحد انرژی داریم. از طرفی چون $y \neq 2^i$ ، پس برای تولید پشیز به طول $y = x + y$ با به هم چسباندن دو پشیز به طول‌های x, y نیاز به حداقل یک واحد انرژی داریم. پس در این حالت نیز صرف حداقل i واحد انرژی نیاز خواهد بود.

حالت ۳، $y > x$ و $y \neq 2^i$: در این حالت اگر $y > 2^{i-1}$ ، در اینصورت با توجه به فرض استقرار برای تولید پشیز به طول y ، حداقل $1 - i$ واحد انرژی و برای چسباندن دو پشیز y, x حداقل یک واحد انرژی نیاز است که این مانند قبل حکم را نتیجه می‌دهد. اما اگر $y \leq 2^{i-1}$ ، در اینصورت برای چسباندن دو پشیز y, x ، صرف $|y - x| \geq 2^{i-1}$ واحد انرژی لازم است. با توجه به این که $3 \geq i$ ، این مقدار از i کمتر نخواهد بود.

آکادمی آموزشی تیزلاین

بادفون اساتید بزرگده کشوری تیزهوشان و کنکور

اکنون با توجه به ادعا می‌توان دید که چون $21^\circ < 25^\circ < 21^\circ$ ، پس صرف 10° واحد انرژی برای به دست آوردن پشیز به طول 10° لازم است و این اثبات ما را کامل می‌کند.

۲۷. $A_1A_2\cdots A_9$ یک ۹ ضلعی منتظم است و نقطه‌های M ، K و N درون آن به گونه‌ای هستند که MKN متوازی‌الاضلاع و A_8A_9N و A_6A_7M متساوی‌الاضلاع هستند. زاویه $\angle MKN$ چه قدر است؟

۶۰ (۵)

۴۵ (۴)


۴۰ (۳)

۳۰ (۲)

۲۰ (۱)

راه حل:

گزینه (۳) صحیح است.



راس‌های این ۹ ضلعی دایره محيطی آن را به ۹ کمان مساوی تقسیم کرده‌اند. پس هر قطعه کمان $= \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$ درجه است. بنابراین زاویه $\angle A_1A_2A_4$ (که رو به رو به ۶ قطعه کمان است) 120° درجه است. زاویه $\angle A_2A_1K$ ، زاویه مجاور آن در متوازی‌الاضلاع، 60° درجه خواهد بود. اما زاویه $\angle A_7A_6A_5$ هم 60° درجه است، چرا که رو به رو به ۳ قطعه کمان است. پس

$$\angle A_7A_6A_5 = \angle A_7A_1K = 60^\circ$$

بنابراین سه نقطه A_1 ، A_5 و K هم خط‌اند. زاویه $\angle KA_5A_4$ (که رو به رو به ۳ قطعه کمان است) 60° درجه است. از طرفی

$$\angle KA_4A_5 = \angle A_7A_6A_5 - \angle A_7A_1K = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

پس مثلث A_4A_5K هم متساوی الاضلاع است.

اگر شکل را 80° درجه حول مرکز دایره به طور ساعت‌گرد دوران دهیم مثلث A_6A_7M به A_6A_5K و مثلث A_8A_9N به A_8A_9K تبدیل می‌شود، چرا که اضلاع 9 ضلعی طی این دوران به هم تبدیل می‌شوند. در نتیجه با این دوران K به M و N به M تبدیل می‌شود. پس کمان MN (روی دایره کوچکتر) 80° درجه است. زاویه $\angle MKN$ (که رو به رو به این کمان است) 40° درجه خواهد بود.

۲۸. فرض کنید A مجموعه نقطه با مختصات صحیح در صفحه باشد و تابع $f : A \rightarrow \{0, 1, 2\}$ دارای این خاصیت است که برای هر x و y صحیح،

$$f(x, y) - f(x+1, y) - f(x-1, y) - f(x, y+1) - f(x, y-1)$$

بر 3 بخش‌پذیر است. کدام گزاره صحیح است؟

(۱) f تابعی ثابت باشد.

(۲) مجموعه‌ای متناهی وجود ندارد که با دانستن f در آن مجموعه، تابع f به صورت یکتا تعیین شود.

(۳) اگر مجموعه نقطه‌ای که f در آن‌ها مقدار 1 را اتخاذ می‌کند، مشخص باشد (فرض کنید این مجموعه ناتهی است) تابع f به صورت یکتا تعیین می‌شود.

(۴) اگر مقدار f را روی نقاطی که هر دو مؤلفه آن‌ها زوج است بدانیم، تابع f به صورت یکتا تعیین می‌شود.

(۵) گزینه‌های ۲ و ۳

راه حل:

گزینه‌ی (۲) صحیح است.

مجموعه‌ی نقاط با مختصات صحیح را با \mathbb{Z}^2 نشان می‌دهیم.

تابعی که در شرط مسئله صدق کند را تابع خوب می‌نامیم.

گزاره‌ی (۱) غلط است. زیرا به سادگی می‌توان دید که تابع زیر یک تابع خوب است،

$$f(x, y) = 3 \quad (\text{بر } 3 \text{ باقیمانده‌ی } x+y)$$

گزاره‌ی (۲) درست است. برای اثبات آن، ابتدا چند تعریف ارائه می‌کنیم.

آکادمی آموزشی تیزلاین

برای هر $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ منظور از همسایه‌های (x, y) ناقاط $(x+1, y)$, $(x-1, y)$, $(x, y+1)$ و $(x, y-1)$ هستند.

اگر S زیرمجموعه‌ای از \mathbb{Z}^2 باشد، آن‌گاه (x, y) را نقطه‌ای درونی از S می‌گوییم اگر خودش و همسایه‌هایش عضو S باشند.

اگر f تابعی از S به $\{0, 1, 2\}$ باشد و (x, y) نقطه‌ای درونی از S باشد، تعریف می‌کنیم


$$\Delta f(x, y) =$$

$$3(f(x, y) - f(x+1, y) - f(x-1, y) - f(x, y+1) - f(x, y-1))$$

برای هر عدد صحیح نامنفی n مجموعه‌های A_n و B_n را به این صورت تعریف می‌کنیم:

$$A_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : |x| + |y| = n\}$$

مثلاً $\{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$ $A_1 =$ در شکل زیر، A_n ‌ها با رنگ‌های مختلف مشخص شده‌اند.



همچنین تعریف می‌کنیم

$$B_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : |x| + |y| \leq n\}$$

تابع $\Delta h(x, y) = \Delta f(x, y)$ را خوب می‌نامیم اگر برای هر $x, y \in B_{n-1}$ برای $h : B_n \rightarrow \{0, 1, 2\}$

حال لم زیر را ثابت می‌کنیم.

آکادمی آموزشی تیزلاین


لم: فرض کنید N عددی طبیعی و $\{0, 1, 2\} \rightarrow B_N : h$ تابعی خوب باشد. در این صورت h را می‌توان به تابعی خوب روی کل \mathbb{Z}^2 گسترش داد.

اثبات لم:

به طور استقرایی تابع h را روی B_n برای هر $n > N$ گسترش می‌دهیم به نحوی که خوب باقی بماند.

فرض کنید h روی B_n تعریف شده باشد و خوب باشد. می‌خواهیم آن را روی B_{n+1} گسترش دهیم به طوری که خوب بماند. به این منظور کافی است آن را روی A_{n+1} تعریف کنیم به نحوی که برای $(x, y) \in A_n$ داشته باشیم $\Delta h(x, y) = 0$ (چون برای $n < m$ بنا بر فرض استقرای شرط مسئله روی A_m برقرار است).

به هر کدام از اعضای A_n ، طبق الگوی شکل زیر، عضوی از A_{n+1} را نسبت می‌دهیم. اعضایی از A_{n+1} که به هیچ عضوی نسبت داده نشده‌اند را عضو آزاد و بقیه را عضو وابسته می‌نامیم. مطابق شکل، اعضای وابسته‌ی A_{n+1} را به ترتیب شماره‌گذاری می‌کنیم. این شماره‌گذاری دارای این خاصیت است: «هر عضو وابسته‌ی A_{n+1} ، به عضوی از A_n وابسته شده که همسایه‌ی هیچ یک از اعضای وابسته‌ی بعدی نیست».



حال ابتدا مقدار تابع h را روی همه‌ی اعضای A_{n+1} برابر با صفر تعریف می‌کنیم. سپس با شروع از عضو وابسته‌ی شماره ۱، مقدار h را روی هر عضو وابسته به نحوی تغییر می‌دهیم که به آن وابسته است صفر شود. با توجه به خاصیت بیان شده در بالا، در نهایت تابع h ای به دست می‌آوریم که برای هر $(x, y) \in A_n$ $\Delta h(x, y) = 0$. (توجه کنید که تغییر مقدار h روی اعضای وابسته‌ی بعدی، مقدار Δh را در نقاط قبلی تغییر نمی‌دهد).

به این ترتیب تابع h روی کل B_{n+1} تعریف می‌شود و برای هر $(x, y) \in B_n$ $\Delta h(x, y) = 0$. داریم $\Delta h(x, y) = 0$ اکنون با بزرگ کردن n به دلخواه، یک تابع h روی کل \mathbb{Z}^2 به دست می‌آوریم که $\Delta h(x, y) = 0$ و اثبات لم تمام می‌شود.

آکادمی آموزشی تیزلاین

جاذبه اساتید بزرگهای کشوری تیزهوشان و کنکور

حال با استفاده از لم بالا می‌توان به راحتی درستی گزاره‌ی ۲ را ثابت کرد. زیرا فرض کنید مقدار f را روی یک مجموعه‌ی متناهی S از نقاط \mathbb{Z}^2 بدانیم. از آن‌جا که مجموعه‌ی S متناهی است، پس عدد طبیعی N وجود دارد که اکنون مقدار تابع f را روی نقاط A_{N+1} به این صورت تغییر می‌دهیم که یکی در میان آن‌ها را بعلاوه و منهای یک می‌کنیم. تابع حاصل از تغییر این مقادیر را g می‌نامیم. دقت کنید که تحديد تابع g به B_{N+1} تابعی خوب است زیرا مقدار g روی B_N همچنان صفر است. پس بنابراین، تابع خوب h وجود دارد که روی B_{N+1} با g برابر است. پس f و h روی B_N و در نتیجه روی S با هم برابرند ولی در کل با هم برابر نیستند. بنابراین با دانستن f روی یک مجموعه‌ی متناهی نمی‌توان آن را به طور یکتا تعیین کرد.

گزاره‌ی (۳) غلط است، زیرا دو تابع زیر، هر دو خوب هستند و مجموعه‌ی نقاطی که مقدار ۱ را اتخاذ می‌کنند یکسان و ناتھی است ولی دو تابع با یکدیگر متفاوت‌اند.

$$f(x, y) = \begin{cases} 3 & \text{برای } x + y + 1 \geq 0 \\ 1 & \text{برای } x + y + 1 < 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 3 & \text{برای } 2x + 2y + 1 \geq 0 \\ 1 & \text{برای } 2x + 2y + 1 < 0 \end{cases}$$

بنابراین گزینه‌ی (۵) نیز نادرست است. پس گزینه‌ی (۲) صحیح است.

۲۹. مثلثی که طول هر سه ضلع عددي در بازه $[1, 2]$ ، و اندازه همه زاویه‌هایش در بازه $[45^\circ, 90^\circ]$ درجه است، را «معتل» می‌گوییم. اختلاف مساحت دو مثلث مععدل حداقل چه قدر است؟

(۵) هیچ‌کدام

$$\frac{12 - 2\sqrt{2}}{8}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\frac{8 - \sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

راه حل:

گزینه‌ی (۱) صحیح است.

فرض کنید مثلث ABC مثلثی مععدل و داری کمترین مساحت باشد و فرض کنید زاویه‌ی A بزرگترین زاویه‌ی آن باشد

پس

$$AB, AC \geq 1, \angle A \geq 60^\circ \Rightarrow \sin(A) \geq \sin(60^\circ) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin(A) \geq \frac{\sqrt{3}}{4}$$

آکادمی آموزشی تیزلاین

همچنین فرض کنید مثلث $A'B'C'$ مثلثی معتمد و داری بیشترین مساحت باشد و فرض کنید زاویه‌ی A' کوچکترین زاویه‌ی آن باشد پس


$$A'B', A'C' \leq 2, \angle A' \leq 60^\circ \Rightarrow \sin(A') \leq \sin(60^\circ) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow S_{A'B'C'} = \frac{1}{2} \cdot A'B' \cdot A'C' \cdot \sin(A') \leq \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow S_{A'B'C'} - S_{ABC} \leq \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

به عنوان مثال مثلث با اضلاع ۲، ۲، ۲ را مثلث با بیشترین مساحت و مثلث با اضلاع ۱، ۱، ۱ را به عنوان کمترین مساحت در نظر بگیرید که حالت تساوی نامساوی بالا بدست می‌آید.

۳۰. مثلثی متساوی‌الاضلاع به ضلع ۵ را به شکل رویه‌رو به مثلث‌هایی به ضلع یک تقسیم کرده‌ایم. به هر یک از رئوس این شبکه‌بندی، برداری دلخواه به طول یک و موازی با یکی از اضلاع مثلث نسبت می‌دهیم. مجموع همه‌ی این بردارها چند حالت مختلف می‌تواند داشته باشد؟



۲۷۷۴ (۵)

۱۳۸۷ (۴)

۷۲۶ (۳)

۳۶۳ (۲)

۱۲۶ (۱)


راه حل:

گزینه‌ی (۴) صحیح است.

برای یافتن مجموع تعدادی بردار می‌توانیم فرض کنیم متحرکی به ترتیب در راستای هر کدام از بردارها و به اندازه‌ی آن بردار حرکت می‌کند سپس برداری که ابتدای آن محل اولیه‌ی متحرک یادشده و انتهای آن محل پایانی متحرک باشد مجموع بردارهای اولیه خواهد بود. بنابراین برای یافتن پاسخ این سوال کافی است تعداد نقاط انتهایی ممکن برای متحرکی که از نقطه‌ی ثابتی شروع به حرکت می‌کند و همه‌ی بردارهای منظور شده در شکل را طی می‌کند بیابیم. توجه کنید که طول و جهت بردارها باعث می‌شود اگر متحرک از نقطه‌ی قرمز در شکل زیر شروع به حرکت کند در هر مرحله روی نقاط سیاه باقی بماند.


آکادمی آموزشی تیزلاین

مجری همایش کلاس و آزمون در سراسر کشور



شکل ۱

پس کافی است تعداد نقاطی که در انتهای می‌تواند در آنها باشد را بیابیم. به استقرا نشان می‌دهیم اگر متحرک ۱ قدم حرکت کند نقاطی که می‌تواند در نهایت در آنها قرار گیرد مرز و داخل یک شش ضلعی منتظم با طول ضلع n خواهد بود. به عنوان مثال برای $n = 5$ همه‌ی نقاط شکل زیر جواب است.




شکل ۲

پایه‌ی استقرا ۲ n است. روشن است که با دو قدم می‌توان به همه‌ی نقاط شکل زیر رسید.


با حضور اساتید بزرگ‌بزرگی کشوری تیزهوشان و کنکور

آکادمی آموزشی تیزلاین



شکل ۳


اکنون فرض کنید حکم را برای $n = k$ می‌دانیم. توجه کنید که شکل مربوط به حالت $1 + k = n$ یک لایه بیش از شکل قبلی است. برای مثال در شکل زیر نقاطی که در هر مرحله اضافه می‌شوند با رنگ‌های مختلف نشان داده شده‌اند.



شکل ۴

توجه کنید که طبق فرض استقرا می‌دانیم به تمامی نقاط غیر از لایه‌ی خارجی می‌توان با k قدم رسید و به علاوه هر خانه در شش ضلعی با طول ضلع $1 + k$ یک خانه‌ی مجاور دارد که در شش ضلعی داخلی و به طول ضلع k قرار دارد بنابراین به هر خانه‌ی شکل با $1 + k$ قدم می‌توان رسید و حکم ثابت می‌شود. از طرفی هر نقطه خارج از این شش ضلعی را که در نظر بگیریم هیچ مسیر با طول کمتر مساوی $1 + k$ تا نقطه‌ی قرمز ندارد. (این حکم را هم با استقرایی مشابه می‌توان نتیجه گرفت). پس ثابت می‌شود با $1 + k$ قدم دقیقاً به نقاط شش ضلعی یادشده می‌توان رسید. حال می‌دانیم که تعداد قدم‌های متحرک ما ۲۱ است پس تعداد نقاط یک شش ضلعی با طول ضلع ۲۱ جواب مورد نظر ما است. توجه

کنید که این شش ضلعی را می‌توان به شش مثلث متساوی الاضلاع به طول ضلع ۲۱ تقسیم کرد. برای مثال در شکل مربوط به شش ضلعی به طول ضلع ۵ این تقسیم‌بندی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵

می‌دانیم تعداد نقاط مثلثی متساوی الاضلاع به طول ضلع n برابر $\frac{6(n+2)(n+1)}{2}$ است پس با در نظر گرفتن نقاط تکراری (نقاط نارنجی و آبی در شکل فوق) تعداد کل نقاط برای شش ضلعی به طول ضلع n برابر

$$\frac{6(n+2)(n+1)}{2} - 6 \times n - 5$$

است. پس جواب ما برابر است با: ۱۳۸۷.



آکادمی تیز لاین

برگزار می کند:

دوره سالانه

بُخْفِيف و بِرَاه
بِرَا شِيزلايني ها

دکتر مینثم کوهگرد

کلاس آنلاین المپیاد
فیزیک (سطح یک)

پنجشنبه ها ۱۸:۱۰ تا ۱۹:۳۰
شروع از ۲۲ آبان

۵ جلسه
۶۰ هزار نو ماد

دکترا فشن به مرام

کلاس آنلاین المپیاد
ایاضی (سطح یک)

یکشنبه ها ۱۵:۲۰ تا ۲۱:۱۵
شروع از ۲۳ آبان

۵ جلسه
۶۰ هزار نو ماد

دکتر رضارحمت الهزاده

کلاس آنلاین المپیاد
شیمی (سطح یک)

شنبه ها ۱۵:۲۰ تا ۲۱:۱۵
شروع از ۲۲ آبان

۵ جلسه
۶۰ هزار نو ماد

دکتر قربانی

کلاس آنلاین المپیاد
زیست شناسی (سطح دو)

سه شنبه ها ۱۵:۲۰ تا ۲۱:۱۵
شروع از ۲۵ آبان

۲۰ جلسه
۸۰ هزار نو ماد

دکتر مینثم کوهگرد

کلاس آنلاین المپیاد
فیزیک (سطح دو)

پنجشنبه ها ۱۵:۲۰ تا ۲۱:۱۵
شروع از ۲۷ آبان

۲۰ جلسه
۸۰ هزار نو ماد

دکتر قربانی

کلاس آنلاین المپیاد
زیست شناسی (سطح یک)

سه شنبه ها ۱۵:۲۰ تا ۱۸:۳۰
شروع از ۲۵ آبان

۵ جلسه
۶۰ هزار نو ماد



ثبت نام در سایت رسمی



tizline.ir



www.tizline.ir

۰۲۱-۹۱۳۰۲۰۰۲

۰۹۳۳-۳۸۴۰۲۰۲



آکادمی آموزشی تیز لاین

با حضور استاد بزرگیه کشوری تیز هوشان و کنکور

تقویم آموزشی آکادمی تیز لاین

سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

#تیزلاین_شو

ترم دو
دوره
سالانه

آغاز ثبت نام: ۱ دی

شروع دوره: ابهمن

پایان دوره: ۲۵ اردیبهشت

۱۵ جلسه

ترم یک
دوره
سالانه

آغاز ثبت نام: شهریور

شروع دوره: ۱۰ مهر

پایان دوره: ۱۸ دی

۱۵ جلسه

ترم
تابستان

آغاز ثبت نام: ۱۰ خرداد

شروع دوره: ۱۲ تیر

پایان دوره: ۲۰ شهریور

۱۰ جلسه

آنلاین تخصص ماست

کلاس، آزمون، مشاوره، تکلیف

ثبت نام در سایت رسمی آکادمی تیز لاین www.Tizline.ir

آزمون های هماهنگ از ۲۵ مهر تا ۱۱ اردیبهشت

@mathmovie6

@Tizline.ir