



آکادمی آنلاین تیز لاین

قوی ترین پلتفرم آموزشی تیز هوشان

برگزار کننده کلاس های آنلاین و حضوری تیز هوشان

و المپیاد از پایه چهارم تا دوازدهم

آزمون های آنلاین و حضوری

مشاوره تخصصی

با اسکن QR کد روبرو
وارد صفحه اینستاگرام
آکادمی تیز لاین شو و از
محتوه های آموزشی
رایگان لذت ببر




TIZLINE.IR

برای ورود به صفحه اصلی سایت آکادمی تیز لاین کلیک کنید


برای دانلود دفترچه آزمون های مختلف برای هر پایه کلیک کنید


برای مطالعه مقالات بروز آکادمی تیز لاین کلیک کنید


پاسخ سوالات در پاسخبرگ وارد شود (استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است)		
ردیف	سوالات	بارم
۱	<p>در هر قسمت جمله داده شده را با انتخاب گزینه درست کامل کنید.</p> <p>آ) گیاه پالایی برای استخراج فلز $\xrightarrow[\text{روی}]{\text{مس}}$ به صرفه نیست.</p> <p>ب) $\xrightarrow[\text{آهن}]{\text{تبیانیم}}$ فلزی محکم و کم چگال و مقاوم در برابر خوردگی است که از آن درساخت بدن دوچرخه استفاده می شود</p> <p>پ) برم در $\xrightarrow[\text{هگزن}]{\text{متیل پتان}} \text{، بیرنگ} \text{ میشود.}$</p> <p>ت) به تبدیل حالت گاز به جامد $\xrightarrow[\text{افزایش}]{\text{چگالش}} \text{ فرازش} \text{ می گویند و سطح انرژی ماده در این تغییر حالت} \xrightarrow[\text{افزایش}]{\text{کاهش}} \text{ می یابد.}$</p> <p>ث) اکسایش گلوکز فرآیندی $\xrightarrow[\text{گرماده}]{\text{گرمگیر}} \text{ می باشد.}$</p>	۱/۵
۲	<p>درستی یا نادرستی عبارات زیر را با بیان دلیل مشخص کنید</p> <p>الف) نیروی بین مولکولی در آلkanها از نوع هیدروزونی است.</p> <p>ب) در فولاد مبارکه، برای استخراج آهن از کربن، استفاده میکنند.</p> <p>پ) اگر به جرم یکسانی از آلومینیم $(c = 0/44 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \text{C}^{-1})$ و نیکل $(c = 0/9 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \text{C}^{-1})$ ، مقدار گرمای یکسانی داده شود، افزایش دمای نیکل کمتر خواهد بود.</p>	۲/۲۵



<p>۱/۵</p> <p>در مقابل هر یک از موارد ستون الف یکی از حروف موجود در ستون را قرار دهید.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">الف</th><th style="text-align: center;">پاسخ</th><th style="text-align: center;">ب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) در جوشکاری خطوط راه آهن به کار می رود.</td><td></td><td>نفت سفید</td></tr> <tr> <td>b) سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.</td><td></td><td> مقاومت در برابر جاری شدن</td></tr> <tr> <td>c) به عنوان سوت هواپیما به کار می رود.</td><td></td><td> سلیسیم</td></tr> <tr> <td>d) در تلویزیون ها و شیشه های رنگی استفاده می شود.</td><td></td><td> واکنش ترمیت</td></tr> <tr> <td>e) عنصری شبہ فلز است.</td><td></td><td> اتن</td></tr> <tr> <td>f) گرانبروی</td><td></td><td> اسکاندیم</td></tr> </tbody> </table>	الف	پاسخ	ب	a) در جوشکاری خطوط راه آهن به کار می رود.		نفت سفید	b) سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.		مقاومت در برابر جاری شدن	c) به عنوان سوت هواپیما به کار می رود.		سلیسیم	d) در تلویزیون ها و شیشه های رنگی استفاده می شود.		واکنش ترمیت	e) عنصری شبہ فلز است.		اتن	f) گرانبروی		اسکاندیم	۳
الف	پاسخ	ب																				
a) در جوشکاری خطوط راه آهن به کار می رود.		نفت سفید																				
b) سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.		مقاومت در برابر جاری شدن																				
c) به عنوان سوت هواپیما به کار می رود.		سلیسیم																				
d) در تلویزیون ها و شیشه های رنگی استفاده می شود.		واکنش ترمیت																				
e) عنصری شبہ فلز است.		اتن																				
f) گرانبروی		اسکاندیم																				
<p>۱/۲۵</p> <p>فلزی است که در شیشه‌ی جلوی کلاه فضانوردان به کار می رود که عایق بسیار خوبی برای جلوگیری از اشعه X می باشد.</p> <p>الف) نام این فلز چیست؟</p> <p>ب) سه ویژگی منحصر به فرد این فلز را بنویسید</p> <p>پ) مشکل استخراج این فلز چیست؟</p>	۴																					
<p>۱/۲۵</p> <p>با توجه به نمودار زیر که تغییر شعاع اتمی عناصر قلیایی تا هالوژن دوره سوم جدول تناوبی را نشان می دهد به سوالات پاسخ دهید.</p> <p>آ) اختلاف تغییرات شعاع بین عناصر دسته ۸ بیشتر است یا عناصر دسته p؟</p> <p>ب) آیا C در دمای اتاق گازی زردرنگ است و برای پایدار شدن می تواند یون C^- را تولید کند؟</p> <p>پ) خصلت نافلزی در این دوره چگونه تغییر می کند و با توجه به آن روند واکنش پذیری از عنصر B تا C را توضیح دهید.</p>	۵																					
<p>۱/۵</p> <p>آرایش الکترونی یون M^{2+} به $3d^5$ ختم شده است.</p> <p>الف) عدد اتمی M را حساب کنید.</p> <p>ب) عنصر اصلی است یا واسطه؟</p> <p>پ) شماره تناوب آن در جدول تناوبی را بنویسید.</p>	۶																					



		باقوچه به واکنشهای زیر به سوالات پاسخ دهد.	
۱		$1. \text{AgCl(s)} + \text{Na(s)} \rightarrow \text{NaCl(s)} + \text{Ag(s)}$ $2. \text{NaCl(s)} + \text{Zn(s)} \rightarrow$ واکنش نمی دهد	۷
		الف) در کدام واکنش واکنش پذیری محصولات از واکنش دهنده ها بیشتر است؟ ب) واکنش پذیری عنصر سدیم را با نقره با ذکر دلیل مقایسه کنید؟	
۱/۷۵		ترکیبات هیدرو کربنی داده شده دقت کنید و سپس به سوالات پاسخ دهید: "۲-متیل پنتان: c ، ۲-متیل بوتان: b ، ۳،۳-دی متیل پنتان: a: "	۸
		آ- مواد را با بیان علت به ترتیب نقطه جوش مرتب نمایید. ب- ساختار ترکیب c را رسم نمایید. پ- کدام ماده بیشترین فراریت را دارد؟	
۱		اگر در مولکول ۲-متیل پنتان به جای یکی از هیدروژن های متصل به کربن شماره ۴ ، یک گروه اتیل قرار دهیم نام آلان جدید را بنویسید؟	۹
۲		الف) هریک از ترکیبات زیر را به روش آیوپاک نامگذاری کنید. a) $\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{C}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{CH}_3$ b)  c) نفتالن d) سیکلو پنتان	۱۰
		ب) ساختار مناسب رسم کنید.	




۱/۵	<p>اگر بازده واکنش زیر برابر ۸۰٪ باشد. از تجزیه ۵۰ گرم NH_4NO_3، درصد خلوص چند میلی لیتر گاز N_2O در شرایط استاندارد آزاد می‌شود؟</p> $\text{NH}_4\text{NO}_3 = 80 \text{ g/mol}$ $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$	۱۱
۱	<p>اگر با دادن J ۷۲۹ گرم‌ما دمای $12 / 5$ گرم اتانول را به 70 درجه سانتی گراد برسانیم دمای اولیه نمونه بر حسب کلوبن چقدر بوده است؟ (گرمای ویژه اتانول برابر $2/430 \text{ J/g.C}$ است)</p>	۱۲
۱	<p>اگر 140 گرم آهن ناخالص با هیدروکلریک اسید واکنش دهد و $75 / 0$ گرم گاز هیدروژن ایجاد شود، درصد خلوص آهن را در نمونه حساب کنید.</p> $\text{Fe (s)} + 2 \text{ HCl(aq)} \longrightarrow \text{FeCl}_4^-(aq) + \text{H}_2(g)$ $(\text{H} = 1 \text{ g/mol}) (\text{Fe} = 56 \text{ g/mol})$	۱۳
۱/۵	<p>الف) نمودار سطح انرژی مواد شرکت کننده در واکنش زیر را کامل کنید :</p> $N_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow 2NH_2(g) + 92kj$ $N_2H_2(g) + H_2(g) \rightarrow 2NH_2(g) + 183kj$ <p>.....a.....</p> <p>.....b....</p> <p>.....c.....</p>	۱۴
	<p>ب) پایداری مواد شرکت کننده در واکنش‌ها را مقایسه کنید .</p>	



ردیف	راهنمای تصحیح	بارم
۱	(آ) روی ۰/۲۵ (ب) تیتانیم ۰/۲۵ (پ) ۲ - هگزن ۰/۲۵ ت) چگالش ۰/۲۵ و کاهش ۰/۲۵ (ث) گرماده ۰/۲۵	۱/۵
۲	الف) نادرست. ۰/۲۵ آلانها چون ناقطبی هستند نیروی بین مولکولی آنها از نوع واندروالسی می باشد ۰/۵ ب) درست ۰/۲۵ چون دسترسی به کربن آسان تر است و صرفه اقتصادی بیشتری دارد ۰/۵ پ) نادرست. ۰/۲۵ از آنجایی که به مقدار یکسانی از دو جسم گرمای یکسانی داده شده هر کدام که ظرفیت گرمایی ویژه‌ی بیشتری دارد یعنی آلومینیوم تغییر دمای کمتری خواهد داشت ۰/۵	۲/۲۵
۳	(آ) d (ب) e (پ) a (ت) f (ج) c (ث) b	۱/۵
۴	الف) طلا ۰/۲۵ ب) رسانایی الکتریکی بالایی دارد ، با گازهای موجود در هوا کره و مواد موجود در بدن انسان واکنش نمی دهد ، بسیار چکش خوار و نرم هست ۰/۵ پ) پسماند بسیار زیادی تولید می کند و آثار زیان بار زیست محیطی بر جای می گذارد . ۰/۵	۱/۲۵
۵	آ) عناصر دسته ۸ زیرا شب نمودار تندتر است. ۰/۲۵ ب) C گوگرداست که بصورت جامدی زردنگ می باشد و برای پایدارشدن یون C^{2-} (S^{2-}) تولید می کند . ۰/۵ پ) در یک دوره از چپ به راست خصلت نافلزی افزایش می یابد بنابراین C بیشترین واکنش پذیری را دارد . ۰/۵	۱/۲۵
۶	الف) ۲۷ (پ) ۰/۵	۱/۵

		۰/۵ . ب) واسطه	
		۰/۵ . پ) چهارم	
۱		۰/۲۵ . الف) واکنش دوم	۷
	ب) واکنش پذیری عنصر سدیم از نقره بیشتر است ۰/۲۵ چون در واکنش ۱ - سدیم نقره را استخراج کرده است	۰/۵	
۱/۷۵		(۰/۵) a>c>b - آ	۸
	با افزایش اتم های کربن نقطه جوش افزایش می یابد(۰/۰) و تعداد اتم های کربن a از بقیه بیشتر و تعداد اتم های کربن b از بقیه کمتر است.(۰/۰)	(۰/۵) ب-(۰/۵)	
	$\begin{array}{ccccccc} & CH_3 & CH & CH_2 & CH_2 & CH_3 \\ & & & & & \\ & CH_3 & & & & \end{array}$	(۰/۲۵) ب-	
۱	$\begin{array}{ccccc} {}^{\Delta}CH_{\tau} & - & {}^{*}CH_{\tau} & - & {}^{*}CH_{\tau} \\ & & & & \\ & & & CH_{\tau} & \\ & & & & \\ & & & {}^{\Delta}CH_{\tau} & \\ & & & & \\ & & & {}^{*}CH_{\tau} & \end{array}$	۹	
	۲ متیل پتان		
	$\begin{array}{ccccc} CH_{\tau} & - & {}^{*}CH & - & {}^{*}CH_{\tau} \\ & & & & \\ {}^{\Delta}CH_{\tau} & & & CH_{\tau} & \\ & & & & \\ {}^{*}CH_{\tau} & & & {}^{*}CH_{\tau} & \end{array}$		
	۲ و ۴ دی متیل هگزان		
۲	(a) ۳-اتیل-۳-و ۵-دی متیل هیبتان (b) ۵-اتیل-۴ و ۴ دی متیل نونان	۱۰	
	C		
	(d)		



۱/۵	$50 \text{ g } \text{NH}_4\text{NO}_3 \times \frac{90}{100} \times \frac{80}{100} \times \frac{1 \text{ mol } \text{NH}_4\text{NO}_3}{80 \text{ g } \text{NH}_4\text{NO}_3} \times \frac{1 \text{ mol } \text{N}_2\text{O}}{1 \text{ mol } \text{NH}_4\text{NO}_3} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol } \text{N}_2\text{O}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 100 \text{ mL } \text{N}_2\text{O}$ <p>مفهوم درصد خلوص و بازده بطور جداگانه هم میتواند نوشته شود</p>	۱۱
۱	$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow 729 = 12/5 \times 2/430 \times \Delta\theta \quad \Delta\theta = 24$ $\theta_1 = 70 - 24 = 46$ $46 + 273 = 319 \text{ K}$	۱۲
۱	$? \text{ g Fe} = 0.75 \text{ g H}_2 \times \frac{1 \text{ mol H}_2}{1 \text{ g H}_2} \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{1 \text{ mol H}_2} \times \frac{56 \text{ g Fe}}{1 \text{ mol Fe}} = 21 \text{ g Fe}$ $\frac{21}{14} = 15\% \quad \text{درصد خلوص}$	۱۳
۱/۶	<p>.a. H_2 و N_2H_4 .b. $^3\text{H}_2$ و N_2 .c. $^2\text{NH}_3$</p> <p>ب- هر چه سطح انرژی مواد بالاتر پایداری کمتر پس: آمونیاک پایدارترین و هیدرازین و مولکول هیدروژن نایپایدارترین گونه ها هستند.</p>	۱۴

